

OPS



Organización
Panamericana
de la Salud



Organización
Mundial de la Salud
OFICINA REGIONAL PARA LAS Américas

Epidemia del VIH y respuesta en América Latina y el Caribe

Noviembre 2021



Panorama de la epidemia del VIH en las Américas a fines del 2020

OMS Región de las Américas

3,7 millones

De personas viven con el VIH



- 6%

Nuevas infecciones anuales, respecto al 2010



- 30%

Muertes anuales respecto al 2010



Fuente: estimaciones de OMS/ONUSIDA, 2021.


Nuevas infecciones por VIH y muertes relacionadas con SIDA, 2010-2020

Nuevas infecciones por el VIH			
Región	Línea de base 2010	2020	Diferencia porcentual con la línea de base (2020-2010)
Caribe	18 000	13 000	-28,4%
América Latina	110 000	100 000	-0,4%
América Latina y el Caribe	120 000	120 000	-4,5%
Región de las Américas	170 000	150 000	-6,4%

Muertes por SIDA			
Región	Línea de base 2010	2020	Diferencia porcentual con la línea de base (2020-2010)
Caribe	12 000	6 000	-50,1%
América Latina	40 000	31 000	-21,9%
América Latina y el Caribe	52 000	37 000	-27,1%
Región de las Américas	65 000	45 000	-30,3%


Fuente: OPS, 2021. Desarrollado a partir de las estimaciones de Spectrum realizadas por ONUSIDA, 2021.

Incidencia del VIH por 1000 habitantes, y pronóstico para 2030 comparado con las metas para poner fin al SIDA, en América Latina y el Caribe, 1995-2030




Fuente: OPS, 2021. Desarrollado a partir de las estimaciones de Spectrum realizadas por ONUSIDA, 2021.

Estimaciones de mortalidad por SIDA, pronóstico para 2030 y metas para poner fin al sida en América Latina y el Caribe, 1995-2030




Fuente: OPS, 2021. Desarrollado a partir de las estimaciones de Spectrum realizadas por ONUSIDA, 2021.

Nuevas infecciones por VIH, muertes y personas que viven con el VIH que reciben tratamiento antirretroviral en América Latina y el Caribe, 1995-2020




Fuente: OPS. Basado en los siguientes datos: ONUSIDA/OMS. Estimaciones de Spectrum HIV 2020. Informes de país GARPR y GAM 2000-2020.

Evolución de la cobertura de tratamiento antirretroviral en América Latina y el Caribe, 1995-2020




Fuente: OPS, 2021. Basado en los siguientes datos: ONUSIDA/OMS. Estimaciones de Spectrum HIV 2020. Informes de país GARPR y GAM 2000-2020.

Evolución de la cobertura de tratamiento antirretroviral (TAR) en el Caribe, 2000-2020




Fuente: OPS, 2021. Basado en los siguientes datos: ONUSIDA/OMS. Estimaciones de Spectrum HIV 2020. Informes de país GARPR y GAM 2000-2020.

Evolución de la cobertura de tratamiento antirretroviral (TAR) en América Latina, 1995-2020



Fuente: OPS, 2021. Basado en los siguientes datos: ONUSIDA/OMS. Estimaciones de Spectrum HIV 2020. Informes de país GARPR y GAM 2000-2020.


Cascada de atención al VIH en América Latina y el Caribe, 2018-2020



Fuente: OPS, 2021. Basado en los siguientes datos: ONUSIDA/OMS. Estimaciones de Spectrum HIV 2020. Informes de pa

Nuevas infecciones por el VIH entre adultos en América Latina (15+) desagregado por sexo


New HIV Infections among adults (15+) - by sex



Fuente: Estimaciones epidemiológicas de ONUSIDA, 2021

Número de muertes relacionadas con SIDA en América Latina entre adultos en América Latina (15+) desagregado por sexo


AIDS-related deaths among adults (15+) - by sex



Fuente: Estimaciones epidemiológicas de ONUSIDA, 2021

Nuevas infecciones por el VIH entre adultos en El Caribe (15+) desagregado por sexo


New HIV Infections among adults (15+) - by sex



Fuente: Estimaciones epidemiológicas de ONUSIDA, 2021



Número de muertes relacionadas con SIDA en El Caribe entre adultos en América Latina (15+) desagregado por sexo

AIDS-related deaths among adults (15+) - by sex




Fuente: Estimaciones epidemiológicas de ONUSIDA, 2021

Avances hacia la eliminación del sida a nivel mundial, en América Latina y en el Caribe, 2020




Fuente: OPS, 2021. Estimaciones epidemiológicas de ONUSIDA, 2021 (ver <https://aidsinfo.unaids.org/>).

Situación de América Latina y el Caribe para alcanzar los objetivos 90-90-90.




Fuente: OPS, 2021. Estimaciones epidemiológicas de ONUSIDA, 2021 (ver <https://aidsinfo.unaids.org/>).

Situación de El Caribe para alcanzar los objetivos 90-90-90





Fuente: OPS, 2021. Desarrollado a partir de las estimaciones de Spectrum realizadas por ONUSIDA, 2021.

Situación de América Latina con respecto a las metas 90-90-90




Fuente: OPS, 2021. Desarrollado a partir de las estimaciones de Spectrum realizadas por ONUSIDA, 2021.

Distribución de nuevas infecciones del VIH (de 15 a 49 años), por grupo de población, América Latina y el Caribe, 2020



Fuente: Estimaciones de ONUSIDA/OMS, 2021.


Personas con diagnóstico tardío de VIH (%) en América Latina y el Caribe, 2016-2020



Fuente: OPS, 2020. Basada en los datos de informes de país en respuesta al cuestionario GAM, 2016-2020.


Nota: Diagnóstico tardío: CD4 basal <200 células/mm³. Valor de la mediana de 18 países. Las mejoras corresponden a 11 países.

Metas 90-90-90 y resultados, en América Latina, 2016-2020




Fuente: OPS, 2021. Obtenida a partir de los datos reportados por los países al GAM y estimaciones de ONUSIDA/OMS, 2021.

Metas 90-90-90 y resultados, en El Caribe, 2016-2020



Fuente: OPS, 2021. Obtenida a partir de los datos reportados por los países al GAM y estimaciones de ONUSIDA/OMS, 2021.


Cobertura de tratamiento antirretroviral por sexo entre adultos por Región de la OMS, 2020




Fuente: OMS. Latest estimates and updates on HIV policies uptake, julio 2021.

Dispensación de ARV para varios meses disponible durante la pandemia de la COVID-19.

América Latina (n=14 países)




Caribe (n=13 países)



Fuente: OPS, 2020. Resultados de una encuesta realizada entre los países en junio de 2020.

Ampliación de la dispensa de antirretrovirales para varios meses de abril a agosto de 2020



Fuente: ONUSIDA, 2021. Análisis de dispensa de ARV para varios meses de TAR y PrEP en América Latina y el Caribe durante la pandemia de la COVID-19.

Situación de la autoprueba del VIH en las políticas nacionales, Noviembre de 2021

Países con política desarrollada

2019: Brasil y Estados Unidos (2)

2020: Haití, Guatemala, Paraguay, Canadá y Trinidad y Tobago (7)

2021: Belice, Colombia y Cuba (10)


Países con política en desarrollo

2021: Bahamas, Honduras, Jamaica, Argentina, Perú, México, Chile, El Salvador, Suriname, y Uruguay (10)

Países con autoprueba disponible*

2021: Belice, Brasil, Canadá, Cuba y Estados Unidos (5)


* Incluye sólo aquellos países que tienen la autoprueba disponible para el público general, ya sea a través de servicios de salud públicos o privados o a través de la compra en farmacias.



Fuente: OPS, 2021. Informes de los países al GAM y comunicación directa con los países, 2021.


Servicios de oferta de PrEP en América Latina y el Caribe, 2017-2021

A fin de 2020, **34.500** personas de América Latina y el Caribe estaban en PrEP (**30.000** personas en América Latina y alrededor de **4.300** personas en el Caribe. **17 países informan usuarios en PrEP**



■ PrEP implementado (política) ■ PrEP implementado (proyecto) ■ PrEP en fase de planificación (política/proyecto)

Usuarios de PrEP por Región (2012-2020)



2021

Política de PrEP (10)

Argentina, Bahamas, Barbados, Brasil, Chile, Cuba, Haití, Paraguay, Uruguay, República Dominicana

Proyecto de PrEP (5)

Ecuador, Guatemala, Jamaica, México, Perú

Planeando política/proyecto (13)


Bolivia, Belice, Costa Rica, El Salvador, Guyana, Panamá, Venezuela, OECS (6)

Fuente: OPS, 2021. Información reportada por los países al GAM y comunicación directa con los países.

Profilaxis post exposición (PEP) para relaciones sexuales consentidas en América Latina y el Caribe, 2020

- El **52% (17/33)** de los países (**4/14** en el Caribe) ofrecen PEP en caso de exposición por relaciones sexuales consentidas.
- Durante 2020 **6/17** países que ofrecen PEP no ocupacional informaron de interrupciones en estos servicios por causa de la pandemia.


Países que ofrecen PEP para relaciones sexuales consentidas n=33



Fuente: OPS, 2021. Información recopilada a través de una encuesta conducida por la OPS en 2020.

Adopción de la política de "tratar a todos" para adultos y adolescentes que viven con el VIH

(datos a junio de 2021)



Descargo de responsabilidad: Los límites y nombres que se muestran y las designaciones utilizadas en este mapa no implican la expresión de ninguna opinión por parte de la Organización Mundial de la Salud con respecto al estado legal de cualquier país, territorio, ciudad o área o de sus autoridades, o relativo a la delimitación de sus fronteras o límites. Las líneas punteadas y discontinuas en los mapas representan líneas fronterizas aproximadas para las cuales puede que aún no haya un acuerdo total.

Fuente: Informe de Monitoreo Global del SIDA (ONUSIDA/OMS/UNICEF) y la Country Intelligence Tool, 2021.

Inclusión del inicio rápido del tratamiento antirretroviral en las políticas nacionales de América Latina y el Caribe, noviembre de 2021




Inicio rápido del tratamiento en 7 días: Bahamas, Barbados, Santa Lucía, Trinidad y Tobago.
Sin política: Antigua y Barbuda, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas
Sin información: Barbados, Dominica.

- 20 países informaron de la disponibilidad de políticas para el inicio rápido del tratamiento
- Solo 3 países informaron sobre la implementación total de estas políticas, y 7 países informaron que esta implementación aún no era efectiva en todo el su territorio.

- Política de inicio de tratamiento en los 7 días posteriores al diagnóstico
- Política de inicio de tratamiento en el mismo día del diagnóstico
- No hay política
- No hay información disponible

Fuente: OPS, 2021. Informes de los países sometidos al GAM y comunicación directa de la OPS con los países, 2021.

Progreso de los países para introducir Dolutegravir (DTG) como primera línea de tratamiento para el VIH, 2020.



Países no distinguibles en el mapa

DTG introducido en guías nacionales y compra iniciada: Bahamas, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, Guyana, Cuba, Jamaica, Haití, República Dominicana


DTG introducido en guías nacionales y compra NO iniciada: Barbados, Colombia, Honduras

DTG introducido como primera línea de tratamiento: Antigua & Barbuda, Dominica, Grenada, St Vincent & Grenadines

DTG no introducido: Trinidad & Tobago

- DTG introducido en guías nacionales y compra iniciada
- DTG introducido en guías nacionales y compra NO iniciada
- DTG introducido como primera línea de tratamiento
- Información no disponible

Porcentaje de personas en primera línea de tratamiento que están en tratamiento con TLD





*El porcentaje de Venezuela está calculado sobre el total de personas en TAR.

Fuente: OPS, 2021. Información reportada por los países al GAM (ONUSIDA/OMS/UNICEF) y WHO Country Intelligence Tool, 2020.

Nota: Si bien las pautas no se han actualizado, Surinam tiene TLD como primera línea preferida desde 2019. Colombia: información a 2021.

Estimación de nuevas infecciones por VIH y muertes por SIDA en América Latina y el Caribe, 2010-2020.




Fuente: OPS, 2021. Obtenida a partir de los datos reportados por los países al GAM y estimaciones de Spectrum realizadas por ONUSIDA, 2021.

Personas con el VIH que reciben TAR (%) por regiones de la OMS, 2020

Regiones de la OMS	% cobertura
Región OMS - África	76
Región OMS - América	71
Región OMS – Mediterráneo Oriental	25
Región OMS- Europa	64
Región OMS- Sudeste Asiático	61
Región OMS – Pacífico Occidental	76


Fuente: ONUSIDA. Estimaciones Spectrum VIH de OMS/ONUSIDA, 2021. Respuestas de los países al informe de Monitoreo Global del SIDA, 2021.

Porcentaje de niños (0-14 años) con VIH que recibe tratamiento antirretroviral, por subregión en América Latina y el Caribe, 2015-2020.




Fuente: ONUSIDA. Estimaciones Spectrum VIH de OMS/ONUSIDA, 2020. Respuestas de los países al informe de Monitoreo Global del SIDA, 2021.

Cobertura de prueba de carga viral y porcentaje de personas en TAR con carga viral suprimida, en América Latina y el Caribe, 2016-2020




Fuente: ONUSIDA. Estimaciones Spectrum VIH de OMS/ONUSIDA, 2020. Respuestas de los países al informe de Monitoreo Global del SIDA, 2021.

Cobertura de la prueba del VIH en mujeres embarazadas por subregión, 2010-2020



Fuente: OPS, 2021. Desarrollado a partir de las respuestas de los países al informe de Monitoreo Global del SIDA, 2021.


Cobertura antirretroviral en embarazadas con VIH y tasa de transmisión maternoinfantil (TMI). América Latina y el Caribe, 2010-2020




Fuente: OPS, 2021. Desarrollado a partir de datos de las estimaciones Spectrum de ONUSIDA 2020 y las respuestas de los países al informe de Monitoreo Global del SIDA, 2021.

Cobertura antirretroviral en embarazadas con VIH y tasa de transmisión materno-infantil (TMI), por subregión 2010-2020

Caribe




América Latina



— ETMI Cobertura TAR (regimen efectivo) — Tasa final de transmisión incluyendo el periodo de lactancia


Fuente: OPS, 2021. Desarrollado a partir de datos de las estimaciones Spectrum de ONUSIDA 2020 y las respuestas de los países al informe de Monitoreo Global del SIDA, 2021.

Número de nuevas infecciones e infecciones por el VIH en niños evitadas gracias a la estrategia de ETMI. América Latina y El Caribe, 1990-2020




Fuente: ONUSIDA. Estimaciones Spectrum de VIH, 2021.

Número de nuevas infecciones e infecciones por el VIH en niños evitadas gracias a la estrategia de ETMI. El Caribe, 1990-2020




Fuente: ONUSIDA. Estimaciones Spectrum de VIH, 2021.

Número de nuevas infecciones e infecciones por el VIH en niños evitadas gracias a la estrategia de ETMI. América Latina, 1990-2020




Fuente: ONUSIDA. Estimaciones Spectrum de VIH, 2021.

Prevalencia de infección por VIH en trabajadoras sexuales, últimos datos disponibles, 2016-2020




Fuente: OPS, 2021. Respuestas de los países al informe de Monitoreo Global del SIDA, 2021.

Prevalencia de infección por VIH en HSH, últimos datos disponibles, 2016-2020




Fuente: OPS, 2021. Respuestas de los países al informe de Monitoreo Global del SIDA, 2021.

Prevalencia de infección por VIH en mujeres transgénero, últimos datos disponibles, 2016-2020




Fuente: OPS, 2021. Respuestas de los países al informe de Monitoreo Global del SIDA, 2021.

Uso de condones entre trabajadoras sexuales en América Latina y el Caribe, por subregión, últimos datos disponibles, 2011-2020




Fuente: OPS, 2021. Desarrollado a partir de datos de las respuestas de los países al informe de Monitoreo Global del SIDA, 2021.

Uso de condones entre HSH en América Latina y el Caribe, por subregión, últimos datos disponibles, 2016-2020




Fuente: OPS, 2021. Desarrollado a partir de datos de las respuestas de los países al informe de Monitoreo Global del SIDA, 2021.

Uso de condones entre mujeres transgénero en América Latina y el Caribe, por subregión, últimos datos disponibles, 2016-2020




Fuente: OPS, 2021. Desarrollado a partir de datos de las respuestas de los países al informe de Monitoreo Global del SIDA, 2021.

Sífilis activa entre trabajadoras sexuales, últimos datos disponibles, 2017-2020



Fuente: OPS, 2021. Desarrollado a partir de datos de las estimaciones Spectrum de ONUSIDA 2020 y las respuestas de los países al informe de Monitoreo Global del SIDA, 2021.

Sífilis activa entre HSH, últimos datos disponibles 2016-2020




Fuente: OPS, 2021. Desarrollado a partir de datos de las estimaciones Spectrum de ONUSIDA 2020 y las respuestas de los países al informe de Monitoreo Global del SIDA, 2021.

Disminución en tamizaje y diagnóstico VIH, América Latina y el Caribe, 2019-2020


-34% en el no. de pruebas de VIH realizadas del 2019 al 2020

-27% en el no. de pruebas con resultado positivo del 2019 al 2020

Número total de pruebas VIH



Pruebas VIH con resultado positivo



Fuente: OPS, 2021. Información reportada por los países al GAM y comunicación directa con los países.

Datos reportados por 20 países de América Latina y el Caribe