



Casos TB/VIH estimados y notificados en Las Américas, 2015-2020



Proporción de casos notificados de TB que conocen su estado de VIH y porcentaje con coinfección TB/VIH; Las Américas, 2010-2020



En el Mundo en el 2020

- La OMS estimó 10 millones de personas con TB.
- 787.000 personas con TB se estima estaban coinfectadas con VIH (9%).

En las Américas en el 2020


La OMS estimó:

- 291.000 casos nuevos de tuberculosis.
- 29.000 casos nuevos de TB en personas con VIH (10%).
- 27.000 muertes por TB, de las cuales el 29% ocurrieron en personas con VIH.
- Que el 80% de los casos con TB/VIH se concentraron en 7 países: Brasil, México, Colombia, Haití, Perú, República Dominicana y Venezuela.

Los países notificaron:


- 197.364 casos nuevos de TB.
- 155.207 personas con TB conocían su estado de VIH (79%). De ellos el 11% resultaron coinfectados con VIH, con una preocupante tendencia a la baja en los últimos tres años.

Casos de TB/VIH estimados, notificados y en tratamiento antirretroviral (TAR), Las Américas, 2017-2020



*TAR: tratamiento antirretroviral

Resultado de tratamiento para casos de TB/HIV, Las Américas, 2013-2019



- El porcentaje de casos notificados de TB/VIH pasó del 71% en el 2019 al 59% en el 2020.
- El 60% de las personas con TB/VIH recibieron TAR, siendo este valor constante en los últimos años.
- Los resultados de la cohorte de casos TB/VIH se han mantenido estables, con alta mortalidad, pérdida de seguimiento y no evaluados.
- Comparativamente con la cohorte de casos nuevos de TB, en la de TB/VIH se triplica la mortalidad y duplica la pérdida en el seguimiento.
- En la última década aproximadamente 1 de cada 2 personas coinfectadas en tratamiento para TB lo finalizaron con éxito. Esta proporción es muy baja.
- Se requiere fortalecer la implementación de las actividades de colaboración TB/VIH para lograr que estos casos se diagnostiquen temprano, se traten oportunamente y se eviten muertes.
- La cobertura de la terapia preventiva con isoniacida (TPI) en personas viviendo con VIH es actualmente muy baja con 23% en el 2020. No todos los países notifican.