

Enfermedades infecciosas emergentes y reemergentes, Región de las Américas

Vol. 1, No. 21—26 noviembre 2003

Recomendaciones de la OMS para la vacuna de influenza

Apéndice a la composición de las vacunas de virus de influenza recomendadas para la temporada 2003-2004

El 28 de febrero último, la OMS publicó las recomendaciones sobre la composición de la vacuna de Influenza para la temporada 2003-2004 en el hemisferio norte (Noviembre 2003-Abril 2004). Debido a la insuficiencia de datos se tomó la decisión de posponer las recomendaciones acerca del componente A (H3N2). Desde entonces, los datos adicionales confirmaron que en los testes de inhibición de la hemoaglutinación (IHA) de los aislamientos más recientes una proporción cada vez mayor difería de A/Panama/2007/99 y se asemejaba a A/Fujian/411/2002. Sin embargo, al no existir aislamientos de virus A/Fujian/411/2002-símil en embrión de pollo apropiado para ser usado como candidato vacunal, además de que muchos de los aislamientos son antigénicamente cercanos a A/Panama/2007/99; se recomienda que el componente A (H3N2) a ser usado en las vacunas de la temporada 2003-2004 contenga un virus A/Moscow/10/99 (H3N2)-símil.

De modo que las vacunas usadas en la temporada 2003-2004 (para el invierno del hemisferio norte) contengan:

- Un virus A/Nueva Caledonia/20/99 (H1N1)-símil.
- Un virus A/Moscow/10/99 (H3N2)-símil*.
- Un virus B/Hong Kong/330/2001- símil**.

* La cepa vacunal ampliamente usada es A/Panama/2007/99.

** Las cepas vacunales usadas actualmente incluyen B/Shandong/7/97, B/Hong Kong/330/2001, B/Hong Kong/1434/2002.

Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS) (2003) [Recommended Composition of Influenza Virus Vaccines for Use in the 2003–2004 Influenza Season](#) (Composición recomendada para vacunas para virus de influenza para usar en la estación 2003–2004, en inglés). *Weekly Epidemiological Record / Relevé épidémiologique hebdomadaire* (WER/REH) 78 (9): 58-64.

Para la temporada de influenza 2004 en el hemisferio sur (de mayo a octubre). se recomienda que las vacunas que se utilicen contengan:

- Un virus A/New Caledonia/20/99(H1N1)-símil.
- Un virus A/Fujian/411/2002(H3N2)-símil*.
- Un virus B/Hong Kong/330/2001-símil**.

* A/Kumamoto/102/2002 y A/Wyoming/3/2003 son virus A/Fujian/411/2002-s cultivados en huevo.

**Los virus usados en las vacunas actualmente son: B/Shandong/7/97, B/Hong Kong/330/2001, B/Hong Kong/1434/2002. El virus B/Brisbane/32/2002 está también disponible como virus vacunal.

Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS), [Recommendations for Influenza Vaccine Composition](#) (Recomendaciones para la composición de la vacuna de influenza, en inglés).