





CÁNCER DE COLORRECTAL EN LAS AMÉRICAS

Tanto en mujeres como en hombres, el cáncer colorrectal es la tercera causa de incidencia y mortalidad por cáncer en las Américas, donde cada año se producen más de 245.000 nuevos casos y 112.000 muertes por este tipo de cáncer.

Proporción de nuevos casos y muertes por cáncer colorrectal en las Américas




Tasas estandarizadas de incidencia y mortalidad por 100.000 personas por país, en mujeres y hombres, 2012




- Canadá y Estados Unidos son los países con mayor incidencia de cáncer colorrectal en hombres y mujeres en la región, y Barbados y Uruguay son los países con mayor mortalidad por éste tipo de cáncer.
- Las menores tasas de incidencia y mortalidad por éste tipo de cáncer se presentan en Guatemala y Honduras.

Número de nuevos casos y muertes por cáncer colorrectal por sexo en 2012 y 2030



- De acuerdo a estimaciones, para el año 2030 el número de nuevos casos y muertes por cáncer colorrectal se incrementarán en 70% y 80%, respectivamente, en ambos sexos en las Américas.

Razón incidencia/mortalidad de cáncer colorrectal por 100.000 personas en hombres y mujeres y PBI per cápita



- La supervivencia en casos de cáncer colorrectal, medida de forma indirecta mediante la razón incidencia/mortalidad, varía ampliamente entre Norte América y el resto de la región.
- En países como Nicaragua o Haití, se produce una muerte por casi cada nuevo caso de este tipo de cáncer, mientras que en Estados Unidos y en Canadá se produce una muerte por cada tres nuevos casos.