

## Reunión de países de América Latina y el Caribe de habla hispana sobre Información Estratégica del VIH

APLICANDO DATOS E INFORMACIÓN DE CALIDAD PARA ACELERAR LA RESPUESTA AL VIH  
Panamá, 5 al 7 de abril de 2016


# *Argentina*

Cascada del continuo de atención del VIH  
Vinculación y retención

Mag. Ariel Adaszko

# Primer pilar


## Población de VIH




# Sistema de Salud y sistemas de información en Argentina

- Fragmentario
- 3 subsectores
- Subsidios cruzados
- Sistemas de información no integrados
- Escasa información de sectores no públicos

**Distribución de nuevos casos de VIH según subsectores de salud**



# Cascada del VIH 2015



## Obstáculos para un buen cálculo de los pilares de vinculación y retención

- Fragmentación de los sistemas de salud.
- Solapamiento y subsidios cruzados.
- Sistema de resguardo de identidad de pacientes.
- Falta de adherencia de los prestadores al uso de los sistemas de información.
- ....



Estudio de cohorte

## Diagnóstico Oportuno y Continuidad en la Atención de las Personas con VIH en la Argentina

### Objetivo:

Evaluar las condiciones de vinculación y seguimiento y la eficacia de los regímenes de TAR en las personas con diagnóstico reciente de infección por VIH o inicio de primer TAR en Argentina durante 2013-2014.



## Metodología


- Estudio de cohorte concurrente con unidad de análisis individual.
- Dos momentos de recolección de datos sobre cada paciente: basal y a los 12 meses calendarios de ingreso al estudio.
- Muestra por conveniencia en base a la distribución jurisdiccional de los nuevos diagnósticos notificados.

El reclutamiento fue en 2014, meses antes del cambio de las guías de tratamiento nacionales



# Resultados preliminares

Se incluyeron 682 personas




De los 587 con diagnóstico reciente:

- 41% de los hombres, 29% de las mujeres y 26% de las trans fueron diagnosticados en etapas sintomáticas.
- 33% tenía menos de 200 CD4, 56% menos de 350 CD4, 73% menos de 500 CD4.
- 82% de los incluidos por diagnóstico reciente continuaban en seguimiento al año. **preliminar**
- 4,7% había fallecido al año. De ellos, el 85% tenía menos de un año de diagnóstico al momento de la muerte.



# Resultados preliminares



## TAR

Entre quienes tienen carga viral detectable:

- 45% Problemas de adherencia
- 17% Desarrollo de resistencia
- 4% Toxicidad

Sólo 70% mantiene retiro regular de medicación.

# ¡ Muchas gracias !

Dirección de Sida y ETS