


Prueba: Inmunización y administración de vacunas



Verdadero Falso

- | | | |
|--------------------------|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 1. La enfermedad leve es una razón para no vacunar. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 2. Si una mujer está amamantando, no se le deben administrar las vacunas recomendadas. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 3. Se debe comprobar la temperatura de un niño de manera rutinaria antes de administrarle las vacunas. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 4. Se debe realizar una prueba de embarazo a las adolescentes de manera rutinaria antes de administrarles la vacuna contra el sarampión, la rubéola y la parotiditis (SRP). |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 5. Si hay un niño con inmunodepresión en el hogar, a los hermanos se les debe administrar la vacuna SRP según el esquema. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 6. Si la primera dosis de vacuna contra la hepatitis B se administró hace más de un año y no se administraron otras dosis posteriormente, se debe repetir la primera dosis. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 7. A todos los trabajadores de salud en contacto con pacientes y que no tengan ninguna contraindicación se les debe administrar la vacuna contra la influenza todos los años. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 8. Nunca cubra o recorte las agujas antes de desecharlas. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 9. Si están indicadas ambas vacunas contra la hepatitis, A y B, es aceptable mezclar las dos vacunas en una jeringa. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 10. Para cada vacunación se debe usar una aguja nueva y una jeringa nueva. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 11. El lateralis vastus (muslo lateral) es el músculo preferido para administrar una inyección intramuscular a un niño menor de 12 meses. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 12. Cuando más de dos vacunas intramusculares se administran a un lactante en una visita, se deben administrar en el músculo glúteo (nalga). |

Respuestas a la prueba

1-F 2-F 3-F 4-F 5-T 6-F 7-T 8-T 9-F 10-T 11-T 12-F

Esta prueba se adaptó de la Immunization Action Coalition (www.iac.org) con traducción al español y el francés a cargo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Si usted erró cualquiera de estas preguntas, puede encontrar explicaciones para las respuestas en "Epidemiology and Prevention of Vaccine-Preventable Diseases" de los CDC ("El libro rosa"), que se puede descargar del sitio web de los CDC, www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/index.html.