



Prevención de la infección por el VIH bajo **LA LUPA**

**Un análisis desde la perspectiva
del sector de la salud
en América Latina y el Caribe**

2017

Prevención de la infección por el VIH bajo LA LUPA

Un análisis desde la perspectiva del sector de la salud en América Latina y el Caribe

2017



Ofrezcamos la prueba del VIH

81%

de las personas con VIH en **América Latina** conocen su estado serológico.


64%

de las personas con VIH en el **Caribe** conocen su estado serológico.



Ofrezcamos pruebas y tratamiento de las ITS

Carga alta de la sífilis en los grupos de población clave (hasta 27% en los HSH, hasta 14% en las TS).



de los países **no ofrecen la prueba de sífilis cuando hacen la prueba del VIH** a los grupos de población clave.



Ofrezcamos PrEP

Indicaciones para la PrEP (según la historia clínica de los últimos 6 meses):

Personas VIH negativas
Parejas sexuales con VIH que no tienen la carga viral suprimida

O

Personas sexualmente activas en un contexto de alta incidencia/prevalencia del VIH

y al menos uno de los siguientes:

- relaciones sexuales vaginales o anales sin preservativo con más de una pareja,
- pareja sexual con uno o varios factores de riesgo de VIH,
- antecedentes de ITS,
- uso de PEP,
- solicitud de PrEP.




EL NÚMERO DE NUEVAS INFECCIONES POR EL VIH ESTÁ LEJOS DE LA META

SIN CAMBIO: Del 2010 al 2016 el número de nuevas infecciones al año se mantuvo en 120 000.

La meta es una **REDUCCIÓN de 75%** para el 2020 frente al 2010.



© Instituto Nacional Cardiopulmonar. Honduras



de las nuevas infecciones ocurren en los grupos de población clave o sus parejas.

- Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres (HSH)
- Trabajadoras sexuales (TS)
- Consumidores de drogas inyectables
- Clientes de trabajadoras sexuales y parejas de población clave
- Mujeres transgénero
- Resto de la población



Ofrezcamos PEP

Países que ofrecen la PEP para las **relaciones sexuales de alto riesgo de mutuo acuerdo**


- Sí
- No



Brindemos

tratamiento a todos

En **América Latina** y el **Caribe**:




80% conoce su estado serológico

56% en tratamiento

46% tiene carga viral suprimida

45%

de los países han adoptado la política de "dar tratamiento a todos"



Pongamos fin a la discriminación

5 PAÍSES

informan que consideran delito las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo.

10 PAÍSES

consideran que el trabajo sexual es un delito.

LAS MUJERES TRANSGÉNERO

son víctimas de delitos motivados por el odio en América Latina y el Caribe.

El abordaje de la prevención combinada de la infección por el VIH se presenta como la mejor opción para que ALC avance hacia las metas fijadas para el 2020 y el 2030.

Las tres áreas del abordaje de la prevención combinada de la infección por el VIH

BIOMÉDICO

Intervenciones con métodos clínicos y médicos, por ejemplo:

- Preservativos y lubricantes
- Prueba del VIH
- Antirretrovirales para todos
- Transmisión vertical
- PrEP y PEP
- Circuncisión masculina voluntaria
- Programas de agujas y jeringas

ESTRUCTURAL

Intervenciones que promueven un ambiente propicio, por ejemplo:

- Descriminalización de la transmisión y de los grupos de población clave
- Abordaje de género y contra la violencia de género
- Leyes para proteger derechos
- Intervenciones para la reducción del estigma y la discriminación



COMPORTAMENTAL

Intervenciones que promueven un comportamiento saludable, por ejemplo:

- Asesoramiento sobre reducción de riesgo
- Educación sexual integral
- Programas de educación entre pares
- Campañas de marketing social (p. ej., del preservativo)



© Instituto Nacional Cardíopulmonar. Honduras

Fuente: Adaptado de International HIV/AIDS Alliance. An advocacy brief for community led organizations, advancing combination HIV prevention, 2016. Disponible en: http://www.aidsalliance.org/assets/000/002/472/web_AllianceUnAids_Comb_prevention_original.pdf?1459762561

