

# Jóvenes y Tabaco

en la Región  
de las Américas

---

Resultados de la Encuesta Mundial  
sobre Tabaco en Jóvenes (2010 – 2017)

---




Organización  
Panamericana  
de la Salud



Organización  
Mundial de la Salud

OFICINA REGIONAL PARA LAS Américas





# PRESENTACIÓN

La Encuesta Mundial sobre Tabaco en Jóvenes (GYTS, por sus siglas en inglés) es un estándar global para el monitoreo sistemático del consumo de tabaco (fumado y sin humo) en los jóvenes y de los indicadores clave de control del tabaco (1). La GYTS forma parte del Sistema Mundial de Vigilancia del Tabaquismo (GTSS, por su sigla en inglés), el mayor sistema mundial de vigilancia de la salud pública jamás desarrollado y mantenido (2). El propósito de la GYTS es mejorar la capacidad de los países para monitorear el consumo de tabaco en los jóvenes, orientar los programas nacionales de prevención y control del tabaco y facilitar la comparación de los datos relacionados con el tabaco a nivel nacional, regional y mundial.

La GYTS es una encuesta de base escolar con representatividad a nivel nacional de estudiantes en grados asociados con las edades de 13-15 años. Desde su lanzamiento en 1999, la encuesta se ha implementado periódicamente en más de 180 países en todo el mundo, incluidos 33 países de la Región de las Américas (3).

GYTS utiliza una metodología estandarizada a nivel mundial que incluye un diseño de muestra de dos etapas en el que las escuelas se seleccionan con una probabilidad proporcional al tamaño de matrículas. Las clases dentro de las escuelas también son seleccionadas aleatoriamente y todos los estudiantes que asisten a esas clases son elegibles para participar de la encuesta.

La encuesta utiliza un cuestionario básico estándar con un conjunto de módulos y preguntas opcionales que cubren los siguientes temas: consumo de tabaco, abandono al consumo de tabaco, exposición al humo de tabaco, publicidad antitabaco y publicidad y promoción pro-tabaco, acceso y disponibilidad para obtener productos de tabaco, conocimientos y actitudes sobre el tabaco (1).

Este folleto presenta los resultados de un conjunto de 22 indicadores obtenidos a través de la GYTS e incluye todos los temas relevantes que cubre la encuesta. Proporciona información de la encuesta más reciente realizada durante el período de 2010 a 2017 en 29 países de la Región de las Américas.

Este folleto es una herramienta para la difusión de datos a los diferentes sectores involucrados en el control del tabaco en la Región, y de igual manera, para ayudar a los países a diseñar, planificar y evaluar intervenciones efectivas para controlar el consumo de tabaco y la exposición a los productos del tabaco entre los jóvenes.

Consumo actual de tabaco  
% (95% IC)Consumo actual de cigarrillos  
% (IC 95%)

Países	Año	Consumo actual de tabaco % (95% IC)			Consumo actual de cigarrillos % (IC 95%)		
		Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres
Antigua y Barbuda	2017	7,5 (6,1 - 9,3)	7,9 (6,1 - 10,2)	7,0 (5,1 - 9,6)	1,4 (0,9 - 2,2)	1,5 (0,8 - 2,7)	1,2 (0,5 - 2,4)
Argentina	2012	24,1 (20,8 - 27,8)	22,7 (20,1 - 25,5)	25,4 (20,3 - 31,2)	19,6 (16,4 - 23,3)	17,4 (14,7 - 20,5)	21,5 (17,1 - 26,7)
Bahamas	2013	12,6 ( 8,8 - 17,7)	16,1 (10,1 - 24,7)	8,4 (5,3 - 13,0)	3,8 (2,5 - 5,8)	4,6 (2,6 - 8,1)	2,6 (1,4 - 4,6)
Barbados	2013	18,2 (15,6 - 21,1)	20,9 (17,1 - 25,2)	15,2 (12,7 - 18,2)	7,0 (5,6 - 8,8)	8,8 (6,7 - 11,6)	5,0 (3,5 - 7,1)
Belice	2014	12,3 (10,2 - 14,8)	16,6 (13,0 - 20,9)	8,2 (5,9 - 11,5)	7,8 (6,1 - 9,9)	10,4 (8,0 - 13,4)	5,4 (3,7 - 7,8)
Bolivia (Estado Plurinacional de)	2012	18,7 (14,5 - 23,7)	20,9 (15,7 - 27,2)	16,4 (9,9 - 26,0)	11,3 (8,9 - 14,3)	15,3 (10,5 - 21,8)	9,9 (6,2 - 15,5)
Chile - Metropolitana	2016	20,3 (15,5 - 26,1)	13,5 (9,7 - 18,4)	26,4 (20,3 - 33,7)	17,2 (13,0 - 22,5)	9,6 (6,3 - 14,5)	24,1 (18,6 - 30,6)
Costa Rica	2013	8,9 (7,2 - 11,0)	9,7 (7,5 - 12,4)	8,1 (6,0 - 10,7)	5,0 (3,8 - 6,6)	5,7 (4,2 - 7,6)	4,3 (2,8 - 6,6)
Cuba	2010	17,1 (14,2 - 20,6)	19,8 (14,7 - 26,2)	15,0 (12,7 - 17,6)	10,6 (8,9 - 12,6)	13,1 (9,8 - 17,3)	8,7 (7,1 - 10,7)
Ecuador	2016	13,0 (11,0 - 15,1)	15,3 (13,0 - 17,9)	10,7 (8,3 - 13,8)	8,0 (6,5 - 9,7)	8,9 (6,7 - 11,8)	7,0 (5,1 - 9,6)
El Salvador	2015	13,1 (10,8 - 15,8)	15,3 (12,3 - 18,8)	10,7 (8,4 - 13,5)	9,9 (7,9 - 12,2)	11,4 (8,7 - 14,7)	8,2 (6,2 - 10,7)
Granada	2016	9,7 (7,9 - 11,7)	12,5 (9,9 - 15,7)	7,1 (5,3 - 9,5)	5,4 (4,0 - 7,3)	6,7 (4,5 - 9,9)	4,1 (2,8 - 6,1)
Guatemala	2015	17,1 (14,9 - 19,6)	19,5 (16,7 - 22,6)	14,4 (11,7 - 17,7)	12,9 (11,1 - 15,1)	14,7 (12,2 - 17,5)	11,1 ( 8,9 - 13,7)
Guyana	2015	14,8 (11,1 - 19,4)	19,0 (13,0 - 26,9)	10,4 (6,6 - 15,9)	8,6 (5,9 - 12,3)	1,3 (8,2 - 210)	3,8 (2,5 - 5,8)
Honduras	2016	7,9 (6,4 - 9,8)	9,6 (7,0 - 13,0)	6,4 (4,8 - 8,4)	5,2 (4,2 - 6,4)	6,1 (4,6 - 8,2)	4,4 (3,1 - 6,0)
Jamaica *	2017	15,6	15,9	15,0	11,2	11,1	10,9
México	2011	19,8 (17,1 - 22,8)	21,6 (17,9 - 26,0)	17,7 (14,6 - 21,3)	14,6 (12,0 - 17,6)	15,8 (11,9 - 20,7)	12,9 (10,0 - 16,5)
Nicaragua	2014	17,6 (15,6 - 19,8)	20,6 (17,5 - 24,1)	14,5 (12,3 - 17,0)	12,2 (10,4 - 14,2)	13,8 (11,5 - 16,6)	10,3 (8,4 - 12,7)
Panamá	2017	7,8 (6,3 - 9,5)	7,9 (6,3 - 9,8)	7,4 (5,5 - 10,0)	3,9 (2,9 - 5,2)	4,2 (3,2 - 5,6)	3,5 (2,3 - 5,3)
Paraguay	2014	7,0 (5,6 - 8,6)	7,4 (5,5 - 9,8)	6,6 (5,2 - 8,2)	3,9 (3,2 - 4,6)	3,9 (2,8 - 5,6)	3,8 (3,1 - 4,6)
Perú	2014	9,7 (7,0 - 13,3)	10,9 (7,4 - 15,8)	8,4 (6,0 - 11,5)	7,7 (5,4 - 11,0)	9,2 (6,2 - 13,5)	6,2 (4,1 - 9,2)
República Dominicana	2016	7,4 (4,1 - 13,0)	8,3 (4,3 - 15,3)	6,0 (3,3 - 10,9)	2,4 (1,3 - 4,5)	2,4 (1,5 - 3,8)	1,8 (0,6 - 4,9)
San Kitts y Nevis	2010	9,2 (6,6 - 12,6)	10,4 (7,0 - 15,1)	7,8 (4,9 - 12,1)	4,0 (2,4 - 6,6)	4,8 (2,7 - 8,5)	3,2 (1,6 - 6,5)
San Vicente y las Granadinas	2011	19,4 (16,2 - 23,2)	23,6 (19,1 - 28,7)	14,6 (11,5 - 18,2)	12,8 (10,0 - 16,4)	16,6 (12,8 - 21,4)	8,5 (5,9 - 12,0)
Santa Lucía	2017	10,2 (8,7 - 12,0)	12,4 (9,9 - 15,5)	8,1 (6,2 - 10,5)	6,3 (5,2 - 7,6)	7,3 (5,4 - 9,6)	5,3 (3,8 - 7,3)
Suriname	2016	11,7 (8,9 - 15,3)	17,1 (13,1 - 22,0)	7,3 (4,5 - 11,6)	8,7 (6,4 - 11,7)	12,8 (9,8 - 16,6)	5,3 (3,1 - 8,9)
Trinidad y Tabago	2017	14,0 (11,9 - 16,3)	17,3 (14,1 - 20,9)	10,8 (8,9 - 13,1)	6,7 (5,3 - 8,4)	8,6 (6,6 - 11,3)	4,9 (3,6 - 6,4)
Uruguay	2014	12,8 (11,1 - 14,8)	12,7 (10,4 - 15,3)	12,5 (1,5 - 14,8)	8,2 (6,7 - 10,0)	7,2 (5,4 - 9,5)	8,7 (7,0 - 10,6)
Venezuela (República Bolivariana de)	2010	9,4 (7,9 - 11,3)	11,0 (8,5 - 14,2)	7,2 (5,2 - 10,0)	5,6 (4,4 - 7,1)	5,8 (4,0 - 8,3)	5,4 (3,6 - 8,0)

Consumo actual de tabaco fumado  
% (IC 95%)

Consumo actual de tabaco sin humo  
% (IC 95%)

Países	Año	Consumo actual de tabaco fumado % (IC 95%)			Consumo actual de tabaco sin humo % (IC 95%)		
		Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres
Antigua y Barbuda	2017	6,1 (4,9 - 7,6)	6,3 (4,7 - 8,4)	5,9 (4,3 - 8,1)	2,1 (1,5 - 3,1)	2,6 (1,6 - 4,2)	1,6 (0,9 - 2,9)
Argentina	2012	22,0 (18,5 - 26,0)	20,2 (17,6 - 23,0)	23,7 (18,5 - 29,7)	3,7 (2,9 - 4,8)	4,4 (3,2 - 6,1)	3,0 (2,0 - 4,5)
Bahamas	2013	10,7 (7,3 - 15,3)	13,8 (8,4 - 21,8)	6,9 (4,4 - 10,7)	2,8 (1,7 - 4,8)	4,0 (2,4 - 6,6)	1,6 (0,6 - 4,0)
Barbados	2013	15,4 (12,9 - 18,2)	18,3 (14,7 - 22,5)	12,3 (9,9 - 15,1)	5,0 (3,8 - 6,5)	5,4 (3,8 - 7,6)	4,7 (3,2 - 6,7)
Belice	2014	11,5 (9,4 - 13,9)	15,7 (12,2 - 20,0)	7,5 (5,4 - 10,4)	2,3 (1,6 - 3,3)	2,9 (1,9 - 4,4)	1,7 (0,8 - 3,6)
Bolivia (Estado Plurinacional de)	2012	17,8 (13,6 - 23,0) <sup>1</sup>	19,8 (14,8 - 27,3) <sup>1</sup>	15,5 (9,0 - 25,5) <sup>1</sup>	3,6 (2,1 - 6,1)	4,5 (2,1 - 9,3)	4,2 (2,1 - 8,1)
Chile - Metropolitana	2016	19,6 (15,0 - 25,1)	12,6 (9,0 - 17,3)	25,9 (19,9 - 32,8)	1,4 (0,9 - 2,3)	1,3 (0,7 - 2,4)	1,5 (0,8 - 2,9)
Costa Rica	2013	8,3 (6,6 - 10,4)	9,0 (6,9 - 11,6)	7,6 (5,6 - 10,3)	1,6 (1,1 - 2,4)	1,7 (1,1 - 2,7)	1,6 (1,0 - 2,5)
Cuba	2010	...	...	...	...	...	...
Ecuador	2016	11,8 (9,9 - 14,1)	13,9 (11,4 - 16,7)	10,0 (7,7 - 12,7)	2,1 (1,7 - 2,6)	2,5 (1,9 - 3,4)	1,8 (1,2 - 2,5)
El Salvador	2015	12,2 (10,0 - 14,7)	14,7 (11,7 - 18,3)	9,4 (7,3 - 12,1)	2,0 (1,4 - 3,0)	2,1 (1,2 - 3,7)	2,0 (1,3 - 2,9)
Granada	2016	8,4 (6,8 - 10,4)	11,0 (8,5 - 14,0)	6,1 (4,5 - 8,2)	1,8 (1,2 - 2,6)	2,0 (1,2 - 3,3)	1,6 (0,8 - 2,9)
Guatemala	2015	15,7 (13,6 - 18,1)	18,0 (15,1 - 21,4)	13,2 (10,6 - 16,3)	2,4 (1,9 - 3,2)	3,0 (2,2 - 4,1)	1,8 (1,2 - 2,8)
Guyana	2015	11,7 (8,6 - 15,7)	16,1 (10,8 - 23,2)	7,5 (4,4 - 12,5)	4,1 (2,7 - 6,0)	4,6 (2,5 - 8,2)	3,0 (1,7 - 5,1)
Honduras	2016	6,1 (5,0 - 7,5)	7,6 (5,6 - 10,1)	4,8 (3,5 - 6,4)	2,2 (1,5 - 3,3)	2,1 (1,6 - 4,4)	1,9 (1,2 - 3,0)
Jamaica *	2017	14,4	14,4	13,9	2,6	2,8	2,5
México	2011	18,1 (15,5 - 21,0) <sup>1</sup>	19,8 (16,2 - 24,0) <sup>1</sup>	16,1 (13,1 - 19,6) <sup>1</sup>	4,9 (3,8 - 6,3)	5,9 (4,3 - 8,2)	3,9 (2,7 - 5,6)
Nicaragua	2014	14,6 (12,8 - 16,7)	16,8 (14,0 - 20,0)	12,3 (10,2 - 14,8)	4,3 (3,5 - 5,1)	5,1 (3,7 - 6,9)	3,3 (2,6 - 4,2)
Panamá	2017	5,9 (4,6 - 7,5)	6,2 (4,8 - 8,0)	5,4 (3,8 - 7,5)	2,3 (1,7 - 3,1)	2,2 (1,3 - 3,5)	2,4 (1,6 - 3,7)
Paraguay	2014	5,8 (4,8 - 6,9)	5,9 (4,7 - 7,4)	5,7 (4,5 - 7,1)	1,9 (1,1 - 3,2)	2,3 (1,1 - 4,9)	1,4 (0,8 - 2,6)
Perú	2014	9,0 (6,4 - 12,5)	10,5 (7,2 - 15,2)	7,4 (5,2 - 10,5)	1,6 (1,0 - 2,5)	1,3 (0,7 - 2,2)	1,9 (1,1 - 3,3)
República Dominicana	2016	4,4 (2,3 - 8,2)	4,2 (2,5 - 6,8)	4,0 (1,8 - 8,9)	3,1 (1,7 - 5,9)	4,2 (1,8 - 9,4)	2,3 (1,2 - 4,6)
San Kitts y Nevis	2010	9,2 (6,6 - 12,6) <sup>1</sup>	10,4 (7,0 - 15,1) <sup>1</sup>	7,8 (4,9 - 12,1) <sup>1</sup>	...	...	...
San Vicente y las Granadinas	2011	16,5 (13,4 - 20,1) <sup>1</sup>	20,6 (16,4 - 25,6) <sup>1</sup>	11,8 (9,0 - 15,5) <sup>1</sup>	6,3 (5,0 - 8,0)	7,1 (4,9 - 10,1)	5,5 (4,0 - 7,5)
Santa Lucía	2017	7,9 (6,7 - 9,3)	9,4 (7,2 - 12,2)	6,4 (4,8 - 8,5)	3,5 (2,4 - 4,9)	4,5 (2,8 - 7,0)	2,4 (1,3 - 4,4)
Suriname	2016	11,1 (8,4 - 14,5)	16,1 (12,3 - 20,6)	7,0 (4,3 - 11,0)	1,1 (0,6 - 2,2)	1,7 (0,8 - 3,8)	0,6 (0,2 - 2,2)
Trinidad y Tabago	2017	11,0 (9,2 - 13,2)	13,6 (11,0 - 16,8)	8,6 (6,7 - 10,9)	4,1 (3,2 - 5,2)	5,0 (3,7 - 6,9)	3,2 (2,3 - 4,4)
Uruguay	2014	9,9 (8,3 - 11,8)	9,6 (7,6 - 12,1)	9,8 (8,0 - 11,9)	3,5 (2,8 - 4,4)	4,0 (3,0 - 5,3)	3,1 (2,3 - 4,2)
Venezuela (República Bolivariana de)	2010	...	...	...	5,1 (4,0 - 6,4)	6,9 (5,3 - 9,1)	2,6 (1,6 - 4,1)

PREVALENCIA

SUSCEPTIBILIDAD

ACCESO Y DISPONIBILIDAD

CESACIÓN

EXPOSICIÓN AL HUMO DE TABACO

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES

MUESTRA Y TASA DE RESPUESTA TOTAL

### Consumo actual de shisha - %



### Consumo actual de cigarrillo electrónico - %



Estudiantes que probaron un cigarrillo por primera vez antes de los 10 años de edad - %

Países	Año	Total		
		Hombres	Mujeres	
Antigua y Barbuda	2017	22,7	21,5	23,9
Argentina	2012	14,4	17,4	11,6
Bahamas	2013	28,1	31,2	24,7
Barbados	2013	23,2	23,9	21,5
Belice	2014	19,1	18,0	19,4
Bolivia (Estado Plurinacional de)	2012	15,0	14,9	15,8
Chile - Metropolitana	2016	9,8	11,3	8,7
Costa Rica	2013	13,2	16,1	9,4
Ecuador	2016	15,3	16,1	14,2
El Salvador	2015	16,2	18,5	13,5
Granada	2016	27,4	31,0	22,5
Guatemala	2015	13,3	13,1	13,4
Guyana	2015	27,4	22,3	37,6
Honduras	2016	14,8	15,4	14,2
Jamaica*	2017	21,5	22,9	19,6
México	2011	14,8 <sup>IV</sup>	14,5 <sup>IV</sup>	15,1 <sup>IV</sup>
Nicaragua	2014	13,8	14,8	11,8
Panamá	2017	13,8	9,7	18,7
Paraguay	2014	26,4	33,9	18,8
Perú	2014	15,4	16,7	13,4
República Dominicana	2016	14,6	20,7	6,4
San Kitts y Nevis	2010	32,9	37,6	25,0
San Vicente y las Granadinas	2011	34,5	34,4	37,3
Santa Lucía	2017	20,2	20,7	19,4
Suriname	2016	23,5	25,3	21,1
Trinidad y Tabago	2017	21,1	22,2	19,5
Uruguay	2014	9,4	12,8	6,7
Venezuela (República Bolivariana de)	2014	16,9	15,5	17,7

PREVALENCIA

SUSCEPTIBILIDAD

ACCESO Y DISPONIBILIDAD

CESACIÓN

EXPOSICIÓN AL HUMO DE TABACO

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES

MUESTRA Y TASA DE RESPUESTA TOTAL

PREVALENCIA	Nunca consumieron tabaco, pero quizá comiencen en el futuro -% (IC 95%)			Nunca fumaron, pero piensan que podrían disfrutar de fumar un cigarrillo - % (IC 95%)				
	Países	Año	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres
SUSCEPTIBILIDAD	Antigua y Barbuda	2017	18,8 (16,3 - 21,6)	20,2 (16,7 - 24,2)	17,5 (13,8 - 21,8)	5,4 (4,1 - 7,0)	5,2 (3,5 - 7,7)	5,5 (3,7 - 8,0)
	Argentina	2012	23,2 (20,4 - 26,4)	19,9 (16,2 - 24,3)	26,1 (21,8 - 31,0)	12,5 (10,0 - 15,4)	12,6 (9,5 - 16,5)	12,2 (8,4 - 17,5)
ACCESO Y DISPONIBILIDAD	Bahamas	2013	32,8 (16,3 - 55,0)	43,8 (17,2 - 74,6)	21,3 (15,1 - 29,1)	7,0 (5,1 - 9,5)	6,1 (2,7 - 13,4)	7,6 (5,2 - 11,0)
	Barbados	2013	25,4 (22,0 - 29,2)	25,3 (20,3 - 31,1)	25,6 (20,7 - 31,1)	8,2 (6,3 - 10,7)	6,1 (3,8 - 9,7)	10,2 (7,6 - 13,5)
CESACIÓN	Belice	2014	21,9 (18,6 - 25,5)	23,6 (19,2 - 28,7)	20,4 (16,1 - 25,4)	4,4 (2,7 - 7,0)	5,5 (2,7 - 11,2)	3,5 (2,2 - 5,5)
	Bolivia (Estado Plurinacional de)	2012	20,6 (15,1 - 27,4) <sup>▼</sup>	36,5 (24,8 - 50,1) <sup>▼</sup>	14,7 (11,0 - 19,3) <sup>▼</sup>	...	...	...
EXPOSICIÓN AL HUMO DE TABACO	Chile - Metropolitana	2016	30,5 (26,4 - 35,0)	25,5 (22,6 - 28,6)	36,7 (29,5 - 44,6)	8,2 (5,6 - 11,7)	7,2 (4,1 - 12,4)	9,4 (6,8 - 12,9)
	Costa Rica	2013	15,6 (13,2 - 18,4)	12,6 (9,7 - 16,2)	18,4 (15,0 - 22,4)	4,3 (3,2 - 5,9)	4,4 (3,1 - 6,4)	4,0 (2,4 - 6,4)
MEDIOS DE COMUNICACIÓN	Cuba	2010	11,7 (9,5 - 14,5) <sup>▼</sup>	11,6 (8,1 - 16,3) <sup>▼</sup>	12,0 (9,3 - 15,3) <sup>▼</sup>	...	...	...
	Ecuador	2016	17,2 (14,7 - 20,0)	16,9 (13,8 - 20,6)	17,2 (15,0 - 19,7)	11,5 (10,4 - 12,6)	13,2 (10,2 - 16,9)	9,9 (8,0 - 12,3)
CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES	El Salvador	2015	13,0 (11,4 - 14,8)	12,9 (10,7 - 15,4)	13,1 (10,8 - 15,8)	8,7 (6,9 - 10,9)	9,7 (7,1 - 13,3)	8,0 (5,6 - 11,2)
	Granada	2016	18,3 (15,6 - 21,3)	18,3 (14,4 - 23,0)	18,3 (14,9 - 22,1)	5,5 (4,2 - 7,4)	5,0 (3,2 - 7,9)	6,0 (4,1 - 8,6)
MUESTRA Y TASA DE RESPUESTA TOTAL	Guatemala	2015	15,2 (12,4 - 18,6)	17,3 (13,1 - 22,4)	13,5 (11,1 - 16,3)	10,1 (7,8 - 12,9)	11,5 (8,2 - 15,9)	8,9 (6,3 - 12,5)
	Guyana	2015	17,0 (12,5 - 22,9)	18,2 (13,5 - 24,0)	15,6 (10,1 - 23,5)	7,8 (4,6 - 13,0)	9,0 (4,1 - 18,7)	6,3 (3,7 - 10,6)
	Honduras	2016	13,1 (11,0 - 15,6)	13,2 (10,2 - 17,1)	12,9 (10,7 - 15,6)	10,3 (8,7 - 12,1)	10,2 (7,5 - 13,6)	9,6 (7,8 - 11,7)
	Jamaica *	2017	23,3	24,3	22,6	9,9	8,3	11,0
	México	2011	27,5 (23,6 - 31,8) <sup>▼</sup>	25,7 (19,8 - 32,7) <sup>▼</sup>	29,2 (24,8 - 33,9) <sup>▼</sup>	...	...	...
	Nicaragua	2014	16,0 (13,9 - 18,3)	15,1 (11,6 - 19,3)	16,5 (13,7 - 19,8)	12,8 (10,4 - 15,7)	14,1 (10,5 - 18,7)	11,9 (9,0 - 15,6)
	Panamá	2017	16,6 (14,0 - 19,5)	18,0 (14,4 - 22,2)	14,8 (12,7 - 17,3)	8,1 (6,5 - 10,1)	8,6 (6,7 - 10,9)	7,7 (5,5 - 10,7)
	Paraguay	2014	12,9 (10,8 - 15,3)	13,7 (10,7 - 17,2)	12,2 (10,6 - 14,0)	9,1 (7,9 - 10,4)	11,3 (9,2 - 13,8)	7,0 (5,6 - 8,9)
	Perú	2014	23,3 (20,9 - 26,0)	25,8 (22,5 - 29,3)	21,3 (18,2 - 24,9)	8,4 (6,4 - 10,8)	9,5 (7,2 - 12,5)	7,4 (4,8 - 11,3)
	República Dominicana	2016	17,6 (13,1 - 23,2)	19,4 (13,3 - 27,4)	16,3 (11,7 - 22,4)	13,0 (9,4 - 17,8)	16,0 (9,8 - 24,9)	10,4 (8,1 - 13,2)
	San Kitts y Nevis	2010	12,5 (9,4 - 16,3) <sup>VI</sup>	15,3 (10,2 - 22,3) <sup>VI</sup>	10,3 (6,6 - 15,6) <sup>VI</sup>	...	...	...
	San Vicente y las Granadinas	2011	16,3 (13,7 - 19,2) <sup>▼</sup>	19,2 (15,4 - 23,6) <sup>▼</sup>	13,4 (10,5 - 17,0) <sup>▼</sup>	8,3 (6,1 - 11,3)	9,3 (6,5 - 13,3)	7,5 (5,0 - 11,3)
	Santa Lucía	2017	22,6 (19,6 - 25,8)	25,1 (20,6 - 30,3)	20,4 (17,3 - 24,0)	...	...	...
	Suriname	2016	16,2 (14,2 - 18,6)	18,8 (14,4 - 24,0)	14,5 (11,7 - 17,9)	5,1 (3,5 - 7,3)	5,2 (3,0 - 8,9)	5,0 (3,6 - 7,0)
	Trinidad y Tabago	2017	17,1 (14,4 - 20,1)	18,8 (14,7 - 23,7)	15,7 (11,7 - 20,8)	7,8 (6,2 - 9,8)	8,0 (5,5 - 11,3)	7,7 (5,7 - 10,3)
	Uruguay	2014	16,6 (14,6 - 18,8)	14,1 (12,1 - 16,3)	18,5 (15,4 - 22,1)	7,8 (6,3 - 9,5)	9,3 (6,9 - 12,3)	6,6 (5,0 - 8,7)
	Venezuela (República Bolivariana de)	2010	...	...	...	...	...	...

Fumadores actuales que no fueron impedidos de comprar cigarrillos por cuenta de su edad - % (IC 95%)

Fumadores actuales que compraron cigarrillos por unidad - % (IC 95%)

Países	Año	Fumadores actuales que no fueron impedidos de comprar cigarrillos por cuenta de su edad - % (IC 95%)			Fumadores actuales que compraron cigarrillos por unidad - % (IC 95%)		
		Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres
Antigua y Barbuda	2017	50,3 (23,5 - 76,8)	25,6 (4,9 - 69,4)	69,8 (32,1 - 91,9)	47,2 (19,6 - 76,6)	74,4 (20,4 - 97,1)	33,9 (9,4 - 71,7)
Argentina	2012	81,5 (72,7 - 88,0)	79,3 (68,1 - 87,3)	82,9 (72,7 - 89,8)	32,8 (22,9 - 44,5)	29,6 (19,5 - 42,1)	34,7 (22,0 - 49,9)
Bahamas	2013	75,4 (48,3 - 91,0)	77,7 (41,9 - 94,4)	69,0 (24,5 - 93,9)	33,3 (10,5 - 67,8)	33,4 (8,5 - 72,9)	45,7 (6,1 - 91,5)
Barbados	2013	64,6 (44,8 - 80,5)	69,4 (43,0 - 87,2)	61,2 (35,8 - 81,7)	26,3 (17,6 - 37,3)	32,3 (18,4 - 50,3)	17,9 (5,6 - 44,5)
Belice	2014	75,2 (63,2 - 84,2)	69,1 (54,7 - 80,5)	87,0 (60,7 - 96,7)	50,9 (38,2 - 63,5)	51,5 (35,1 - 67,5)	49,9 (35,6 - 64,2)
Bolivia (Estado Plurinacional de)	2012	90,4 (77,1 - 96,3)	84,8 (66,9 - 93,9)	94,5 (73,0 - 99,1)	...	...	...
Chile - Metropolitana	2016	57,8 (50,3 - 64,9)	65,3 (51,3 - 77,0)	54,5 (46,1 - 62,7)	39,1 (30,4 - 48,6)	40,8 (18,8 - 67,2)	38,4 (30,2 - 47,4)
Costa Rica	2013	63,5 (50,6 - 74,6)	63,8 (48,1 - 77,0)	62,9 (38,7 - 82,0)	29,5 (17,6 - 45,0)	27,5 (13,0 - 49,1)	32,4 (14,1 - 58,3)
Cuba	2010	62,0 (49,5 - 73,0)	62,0 (48,3 - 74,1)	61,9 (39,4 - 80,2)	...	...	...
Ecuador	2016	51,8 (43,8 - 59,7)	54,9 (41,5 - 67,6)	47,7 (37,2 - 58,4)	55,5 (49,6 - 61,3)	58,4 (48,6 - 67,6)	52,6 (44,1 - 60,9)
El Salvador	2015	60,9 (55,4 - 66,2)	62,2 (50,0 - 73,0)	59,8 (49,2 - 69,6)	49,1 (39,2 - 59,0)	47,3 (33,7 - 61,3)	51,7 (39,7 - 63,5)
Granada	2016	70,4 (54,9 - 82,3)	67,7 (45,3 - 84,1)	75,1 (52,8 - 89,0)	61,2 (43,0 - 76,6)	72,7 (54,1 - 85,8)	47,0 (22,4 - 73,1)
Guatemala	2015	72,5 (63,3 - 80,1)	74,0 (64,4 - 81,7)	70,8 (60,0 - 79,6)	62,8 (57,3 - 68,0)	63,9 (57,0 - 70,3)	61,3 (50,6 - 71,0)
Guyana	2015	48,9 (33,9 - 64,2)	46,5 (32,7 - 60,9)	67,0 (20,3 - 94,2)	19,0 (11,8 - 29,0)	17,5 (9,5 - 30,0)	28,2 (4,3 - 77,3)
Honduras	2016	55,9 (44,8 - 66,5)	58,7 (45,4 - 70,9)	52,5 (33,9 - 70,5)	45,2 (29,1 - 62,4)	58,6 (39,1 - 75,7)	30,4 (15,5 - 51,1)
Jamaica	2017	63,5	69,9	60,0	51,6	46,2	55,9
México	2011	65,1 (53,3 - 75,4)	63,8 (49,3 - 76,2)	69,4 (45,2 - 86,2)	17,8 (13,3 - 23,3) <sup>IX</sup>	13,7 (8,1 - 22,2) <sup>IX</sup>	21,7 (16,0 - 28,7) <sup>IX</sup>
Nicaragua	2014	51,3 (42,1 - 60,3)	54,1 (39,7 - 67,9)	49,5 (41,2 - 57,9)	60,3 (52,4 - 67,6)	58,7 (47,2 - 69,3)	61,7 (49,9 - 72,3)
Panamá	2017	58,4 (47,0 - 69,0)	62,1 (44,8 - 76,8)	54,3 (34,7 - 72,7)	58,7 (39,8 - 75,4)	58,7 (36,0 - 78,3)	61,8 (38,4 - 80,8)
Paraguay	2014	79,1 (63,1 - 89,4)	69,2 (49,6 - 83,7)	90,5 (73,0 - 97,1)	18,7 (8,4 - 36,5)	12,1 (3,0 - 37,4)	25,6 (11,2 - 48,4)
Perú	2014	37,3 (23,7 - 53,2)	45,0 (26,8 - 64,6)	25,9 (13,1 - 44,9)	40,9 (25,7 - 58,2)	45,0 (29,8 - 61,3)	34,6 (16,4 - 58,8)
República Dominicana	2016	95,1 (60,5 - 99,6)	90,9 (44,8 - 99,2)	100,0	55,1 (12,0 - 91,7)	62,0 (22,4 - 90,2)	63,2 (7,8 - 97,2)
San Kitts y Nevis	2010	31,0 (3,6 - 84,3)	31,0 (3,6 - 84,3)	-	...	...	...
San Vicente y las Granadinas	2011	56,1 (33,3 - 76,6)	47,1 (22,0 - 73,7)	76,8 (42,7 - 93,6)	...	...	...
Santa Lucía	2017	61,4 (40,3 - 78,9)	51,8 (30,7 - 72,2)	82,8 (47,8 - 96,2)	39,1 (24,8 - 55,6)	35,6 (19,0 - 56,6)	47,4 (21,7 - 74,5)
Suriname	2016	77,6 (64,8 - 86,7)	79,9 (63,1 - 90,2)	71,9 (38,7 - 91,2)	41,9 (30,1 - 54,6)	39,1 (29,1 - 50,1)	51,9 (16,0 - 86,0)
Trinidad y Tabago	2017	62,1 (49,7 - 73,2)	68,0 (48,4 - 82,9)	50,3 (26,8 - 73,7)	31,3 (19,0 - 47,0)	28,4 (14,0 - 49,1)	37,8 (18,5 - 61,8)
Uruguay	2014	74,1 (68,2 - 79,3)	71,4 (61,6 - 79,5)	77,5 (66,2 - 85,8)	41,5 (34,7 - 48,6)	36,5 (24,4 - 50,6)	45,7 (38,3 - 53,3)
Venezuela (República Bolivariana de)	2010	32,9 (0,3 - 98,9)	41,5 (20,5 - 66,1)	18,8 (2,7 - 63,8)	56,9 (45,0 - 68,1) <sup>IX</sup>	53,5 (39,3 - 67,2) <sup>IX</sup>	62,3 (44,9 - 77,0) <sup>IX</sup>

PREVALENCIA

SUSCEPTIBILIDAD

ACCESO Y DISPONIBILIDAD

CESACIÓN

EXPOSICIÓN AL HUMO DE TABACO

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES

MUESTRA Y TASA DE RESPUESTA TOTAL

Fumadores actuales que intentaron dejar de fumar en los últimos 12 meses - %

Fumadores actuales que alguna vez recibieron ayuda o asesoramiento de un programa o profesional para dejar de fumar - %

PREVALENCIA	Países	Año	Fumadores actuales que intentaron dejar de fumar en los últimos 12 meses - %			Fumadores actuales que alguna vez recibieron ayuda o asesoramiento de un programa o profesional para dejar de fumar - %		
			Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres
SUSCEPTIBILIDAD	Antigua y Barbuda	2017	46,3	55,6	38,7	11,4	15,3	7,6
	Argentina	2012	63,1	69,3	58,6	8,3	11,9	5,8
ACCESO Y DISPONIBILIDAD	Bahamas	2013	60,6	64,7	47,0	16,8	22,3	4,6
	Barbados	2013	55,5	57,6	49,1	13,1	14,8	10,5
CESACIÓN	Belice	2014	67,1	66,9	67,6	18,8	17,6	21,4
	Bolivia (Estado Plurinacional de)	2012	68,6	80,0	39,0	11,0 <sup>IX</sup>	2,1 <sup>IX</sup>	11,6 <sup>IX</sup>
EXPOSICIÓN AL HUMO DE TABACO	Chile - Metropolitana	2016	57,5	63,3	55,1	13,0	16,1	12,0
	Costa Rica	2013	63,3	59,8	68,7	8,2	9,1	7,0
MEDIOS DE COMUNICACIÓN	Cuba	2010	57,9	53,0	63,2	20,4 <sup>IX</sup>	20,9 <sup>IX</sup>	19,0 <sup>IX</sup>
	Ecuador	2016	56,8	64,8	45,4	18,9	19,3	18,5
CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES	El Salvador	2015	73,2	71,2	77,2	19,9	19,3	21,0
	Granada	2016	56,9	59,8	53,0	15,7	16,9	13,5
MUESTRA Y TASA DE RESPUESTA TOTAL	Guatemala	2015	70,9	72,4	69,0	11,7	12,2	8,7
	Guyana	2015	70,1	78,8	46,8	30,4	29,0	33,8
	Honduras	2016	75,6	69,2	82,4	21,1	19,4	22,6
	Jamaica *	2017	46,3	50,0	43,8	19,2	20,4	15,9
	México	2011	59,6	57,0	63,0	21,0 <sup>IX</sup>	26,7 <sup>IX</sup>	15,6 <sup>IX</sup>
	Nicaragua	2014	71,1	68,7	73,6	17,1	14,9	19,8
	Panamá	2017	65,6	68,0	62,5	21,1	23,6	17,6
	Paraguay	2014	67,9	60,8	77,8	12,3	13,0	11,6
	Perú	2014	62,4	64,8	58,7	22,3	22,1	22,6
	República Dominicana	2016	45,9	82,4	23,5	24,6	51,5	0,0
	San Kitts y Nevis	2010	91,3	92,4	88,5	9,8 <sup>IX</sup>	6,2 <sup>IX</sup>	16,7 <sup>IX</sup>
	San Vicente y las Granadinas	2011	70,1	62,8	84,4	15,0 <sup>IX</sup>	15,7 <sup>IX</sup>	7,7 <sup>IX</sup>
	Santa Lucía	2017	61,8	68,0	53,5	21,6	21,9	21,2
	Suriname	2016	65,5	74,3	51,3	39,5	41,9	35,5
	Trinidad y Tabago	2017	56,8	53,9	62,4	22,8	25,4	18,1
	Uruguay	2014	51,2	48,5	52,5	17,8	20,0	15,6
	Venezuela (República Bolivariana de)	2010	76,2	71,1	80,1	4,5 <sup>IX</sup>	2,8 <sup>IX</sup>	6,6 <sup>IX</sup>

Exposición al humo de tabaco en el hogar - %

Exposición al humo de tabaco en lugares públicos cerrados - %

Estudiantes que vieron a alguien fumar dentro de la escuela o en entornos abiertos del predio escolar - %

Países	Año	Exposición al humo de tabaco en el hogar - %		Exposición al humo de tabaco en lugares públicos cerrados - %		Estudiantes que vieron a alguien fumar dentro de la escuela o en entornos abiertos del predio escolar - %	
		Total		Total		Total	
Antigua y Barbuda	2017	17,6		30,9		25,1	
Argentina	2012	47,5		52,5		48,5	
Bahamas	2013	29,9		40,9		28,1	
Barbados	2013	19,1		33,2		28,8	
Belice	2014	18,1		43,9		26,1	
Bolivia (Estado Plurinacional de)	2012	34,5		46,6 <sup>x</sup>		...	
Chile - Metropolitana	2016	38,6		47,4		54,6	
Costa Rica	2013	16,7		40,3		40,4	
Cuba	2010	51,5		60,4 <sup>x</sup>		...	
Ecuador	2016	16,7		31,5		32,8	
El Salvador	2015	17,2		42,7		40,2	
Granada	2016	18,2		40,4		24,4	
Guatemala	2015	21,6		38,6		28,2	
Guyana	2015	18,5		28,6		28,9	
Honduras	2016	13,5		24,2		20,7	
Jamaica*	2017	32,1		48,2		31,5	
México	2011	33,3		44,6 <sup>x</sup>		...	
Nicaragua	2014	28,7		38,3		36,9	
Panamá	2017	16,7		31,7		28,9	
Paraguay	2014	21,9		27,9		27,9	
Perú	2014	13,6		30,8		19,9	
República Dominicana	2016	14,1		24,4		18,0	
San Kitts y Nevis	2010	20,7		52,2 <sup>x</sup>		...	
San Vicente y las Granadinas	2011	32,6		49,9 <sup>x</sup>		...	
Santa Lucía	2017	26,8		42,7		20,9	
Suriname	2016	35,1		42,7		42,4	
Trinidad y Tabago	2017	25,8		30,2		31,9	
Uruguay	2014	40,6		40,1		37,0	
Venezuela (República Bolivariana de)	2010	...		...		...	

PREVALENCIA

SUSCEPTIBILIDAD

ACCESO Y DISPONIBILIDAD

CESACIÓN

EXPOSICIÓN AL HUMO DE TABACO

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES

MUESTRA Y TASA DE RESPUESTA TOTAL

Estudiantes que observaron alguna publicidad o promoción de productos de tabaco en los puntos de venta -%

Estudiantes a quienes algún representante de una empresa tabacalera les ofreció un producto de tabaco sin costo - %

PREVALENCIA	Países	Año	Estudiantes que observaron alguna publicidad o promoción de productos de tabaco en los puntos de venta -%			Estudiantes a quienes algún representante de una empresa tabacalera les ofreció un producto de tabaco sin costo - %		
			Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres
SUSCEPTIBILIDAD	Antigua y Barbuda	2017	27,3	24,7	29,9	5,0	4,9	5,0
	Argentina	2012	70,7	69,1	71,9	5,6	6,5	4,5
ACCESO Y DISPONIBILIDAD	Bahamas	2013	23,6	23,3	24,2	15,2	25,0	4,2
	Barbados	2013	34,8	36,3	33,4	6,9	8,2	5,4
CESACIÓN	Belice	2014	27,2	26,9	27,5	7,8	8,7	6,9
	Bolivia (Estado Plurinacional de)	2012	77,7 <sup>XI</sup>	80,4 <sup>XI</sup>	74,2 <sup>XI</sup>	13,6 <sup>XII</sup>	17,6 <sup>XII</sup>	12,8 <sup>XII</sup>
EXPOSICIÓN AL HUMO DE TABACO	Chile - Metropolitana	2016	39,6	38,1	40,6	6,9	7,9	6,0
	Costa Rica	2013	42,9	43,4	42,4	4,7	5,4	4,0
MEDIOS DE COMUNICACIÓN	Cuba	2010	...	...	...	11,6 <sup>XII</sup>	13,7 <sup>XII</sup>	9,8 <sup>XII</sup>
	Ecuador	2016	38,7	40,8	36,5	5,4	6,4	4,0
CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES	El Salvador	2015	46,9	46,9	47,0	7,5	9,5	5,5
	Granada	2016	30,2	31,9	28,4	4,8	6,6	3,1
MUESTRA Y TASA DE RESPUESTA TOTAL	Guatemala	2015	54,1	53,7	54,7	8,5	9,6	7,6
	Guyana	2015	30,3	32,3	28,0	11,5	16,0	7,0
	Honduras	2016	31,0	32,2	30,3	5,0	4,9	5,1
	Jamaica *	2017	32,2	33,4	31,5	5,6	8,0	3,8
	México	2011	...	...	...	10,9 <sup>XII</sup>	12,1 <sup>XII</sup>	10,1 <sup>XII</sup>
	Nicaragua	2014	44,7	45,9	43,7	7,5	9,3	5,6
	Panamá	2017	26,5	27,2	25,9	7,3	9,1	5,3
	Paraguay	2014	52,3	50,7	53,8	6,6	8,4	4,7
	Perú	2014	32,7	32,7	32,7	5,2	7,0	3,3
	República Dominicana	2016	35,1	37,8	33,0	9,9	11,7	8,2
	San Kitts y Nevis	2010	60,4 <sup>XI</sup>	58,3 <sup>XI</sup>	62,3 <sup>XI</sup>	7,9 <sup>XII</sup>	9,7 <sup>XII</sup>	5,3 <sup>XII</sup>
	Saint Vincent and the Grenadines	2011	65,6 <sup>XI</sup>	64,9 <sup>XI</sup>	66,1 <sup>XI</sup>	10,3 <sup>XII</sup>	11,8 <sup>XII</sup>	9,1 <sup>XII</sup>
	Santa Lucía	2017	25,6	23,7	27,7	6,5	7,9	4,8
	Suriname	2016	35,5	35,1	35,4	5,8	7,2	4,7
	Trinidad y Tabago	2017	28,7	30,8	26,6	8,6	10,5	6,8
	Uruguay	2014	58,1	55,8	59,9	5,7	7,0	4,5
	Venezuela (República Bolivariana de)	2010	...	...	...	17,9 <sup>XII</sup>	16,8 <sup>XII</sup>	18,7 <sup>XII</sup>

Fumadores actuales que pensaron en dejar de fumar debido a las imágenes de advertencia sanitaria - %

Países	Año	Total	Hombres	Mujeres
Antigua y Barbuda	2017	21,7	22,0	21,5
Argentina	2012	41,4	47,0	37,4
Bahamas	2013	29,5	30,7	28,5
Barbados	2013	21,3	24,9	15,7
Belice	2014	36,0	42,4	23,0
Bolivia (Estado Plurinacional de)	2012	...	...	...
Chile - Metropolitana	2016	31,6	35,3	29,5
Costa Rica	2013	19,2	20,6	17,7
Cuba	2010	...	...	...
Ecuador	2016	26,0	28,7	22,7
El Salvador	2015	37,7	42,7	31,2
Granada	2016	20,6	14,6	30,0
Guatemala	2015	30,9	29,1	33,3
Guyana	2015	31,3	31,8	30,1
Honduras	2016	41,1	46,6	32,7
Jamaica*	2017	32,8	29,1	36,5
México	2011	...	...	...
Nicaragua	2014	30,0	29,1	30,9
Panamá	2017	38,3	43,2	34,8
Paraguay	2014	29,2	36,2	22,0
Perú	2014	34,5	41,2	25,4
República Dominicana	2016	24,1	45,6	6,2
San Kitts y Nevis	2010	...	...	...
San Vicente y las Granadinas	2011	...	...	...
Santa Lucía	2017	22,1	25,8	16,6
Suriname	2016	37,2	38,6	34,6
Trinidad y Tabago	2017	21,0	23,4	17,2
Uruguay	2014	26,0	21,0	28,7
Venezuela (República Bolivariana de)	2010	...	...	...

PREVALENCIA

SUSCEPTIBILIDAD

ACCESO Y DISPONIBILIDAD


CESACIÓN

EXPOSICIÓN AL HUMO DE TABACO

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES

MUESTRA Y TASA DE RESPUESTA TOTAL



Muestra y tasa de respuesta total - %

Países	Año	Total de estudiantes de la muestra	Total de estudiantes que participaron de la encuesta	Tasa de respuesta total
Antigua y Barbuda	2017	2.603	2.268	87,1
Argentina	2012	3.459	2.789	76,9
Bahamas	2013	1.520	1.309	76,2
Barbados	2013	2.109	1.718	74,9
Belice	2014	2.115	1.900	83,6
Bolivia (Estado Plurinacional de)	2012	3.713	3.373	88,9
Chile - Metropolitana	2016	3.628	2.778	68,4
Costa Rica	2013	4.010	3.152	77,0
Cuba	2010	3.342	2.533	90,8
Ecuador	2016	6.120	5.462	83,9
El Salvador	2015	3.888	3.215	82,7
Granada	2016	2.323	2.133	91,8
Guatemala	2015	5.097	4.301	81,3
Guyana	2015	2.132	1.697	77,4
Honduras	2016	4.166	3.515	84,4
Jamaica	2017	2.436	1.685	56,7
México	2011	3.309	2.772	77,1
Nicaragua	2014	6.218	4.604	60,3
Panamá	2017	3.108	2.621	84,3
Paraguay	2014	7.496	6.518	87,0
Perú	2014	4.162	3.818	89,9
República Dominicana	2016	1.928	1.532	79,5
San Kitts y Nevis	2010	1.132	837	73,9
San Vicente y las Granadinas	2011	1.908	1.544	80,9
Santa Lucía	2017	1.773	1.495	84,3
Suriname	2016	2.567	2.212	86,2
Trinidad y Tabago	2017	4.551	4.128	90,7
Uruguay	2014	5.709	4.902	85,9
Venezuela (República Bolivariana de)	2010	3.276	2.863	75,9

PREVALENCIA

SUSCEPTIBILIDAD

ACCESO Y DISPONIBILIDAD

CESACIÓN

EXPOSICIÓN AL HUMO DE TABACO

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES

MUESTRA Y TASA DE RESPUESTA TOTAL

# NOTAS TÉCNICAS

## SOBRE LA ENCUESTA

Las encuestas se realizaron en diferentes años para diferentes países entre 2010 y 2017. Durante este período, algunos países han implementado la encuesta más de una vez. La información presentada en este folleto son los datos de la GYTS más reciente disponible en cada país. Los datos de Colombia, Dominica y Haití no se incluyeron en este folleto pues los últimos datos disponibles son de encuestas realizadas antes del 2010. Todos los resultados presentados en este folleto son representativos a nivel nacional, excepto para de Chile que corresponden al área metropolitana.

## NOTAS

Los porcentajes reflejan la prevalencia de cada indicador en cada grupo y no la distribución entre grupos.

... - No hay datos disponibles o no hay información.

\* (Jamaica) - Debido a una baja tasa de respuesta total (<60%), los datos no están ponderados. Los porcentajes presentados reflejan únicamente la prevalencia de cada indicador correspondiente a la población muestreada.

## DEFINICIÓN DE INDICADORES

• **Consumo actual de tabaco** - Encuestados que, en los 30 días previos a la encuesta, fumaron cigarrillos en uno o más días, o fumaron cualquier producto de tabaco que no fuera cigarrillos, o consumieron cualquier producto de tabaco sin humo.

• **Consumo actual de cigarrillos** - Encuestados que fumaron cigarrillos en uno o más días en los 30 días previos a la encuesta.

• **Consumo actual de tabaco fumado** - Encuestados que, en los 30 días previos a la encuesta, o fumaron cigarrillos en uno o más días, o fumaron cualquier otro producto de tabaco que no fuera cigarrillos.

<sup>I</sup> Encuestados que, en los 30 días previos a la encuesta, o fumaron cigarrillos en uno o más días, o consumieron cualquier otro producto de tabaco fumado que no fuera cigarrillos.

• **Consumo actual de tabaco sin humo** - Encuestados que consumieron cualquier producto de tabaco sin humo en los 30 días previos a la encuesta.

• **Consumo actual de shisha** - Encuestados que fumaron shisha (pipa de agua, narguile o hookah) en uno o más días en los 30 días previos a la encuesta.

<sup>II</sup> Encuestados que han fumado shisha (pipa de agua, narguile o hookah) en los 30 días previos a la encuesta.

• **Consumo actual de cigarrillo electrónico** - Encuestados que usaron cigarrillos electrónicos en uno o más días en los 30 días previos a la encuesta.

<sup>III</sup> Encuestados que han usado cigarrillos electrónicos en los 30 días previos a la encuesta.

• **Estudiantes que probaron un cigarrillo por primera vez antes de los 10 años de edad** - Encuestados que alguna vez fumaron un cigarrillo y que lo probaron por primera vez antes de los 10 años de edad.

<sup>IV</sup> Encuestados que alguna vez fumaron un cigarrillo y que lo probaron por primera vez a los 10 años o menos.

• **Nunca consumieron tabaco, pero quizá comiencen en el futuro** -

Encuestados que nunca han consumido cualquier producto de tabaco y respondieron:

“Definitivamente sí”, “Probablemente sí” o “Probablemente no” al consumo de tabaco si uno de sus mejores amigos le ofreciese, o respondió “Definitivamente sí”, “Probablemente sí” o “Probablemente no” si piensa en consumir de tabaco en algún momento durante los próximos 12 meses. <sup>V</sup> Encuestados que nunca han consumido cualquier producto de tabaco y respondieron “Definitivamente sí”, “Probablemente sí” o “Probablemente no” a fumar si uno de sus mejores amigos le ofreciese un cigarrillo; o respondió “Definitivamente sí”, “Probablemente sí” o “Probablemente no” si piensa en fumar un cigarrillo en algún momento durante los próximos 12 meses.

<sup>VI</sup> Encuestados que nunca han consumido cualquier producto de tabaco y respondieron “Definitivamente sí”, “Probablemente sí” o “Probablemente no” a fumar si uno de sus mejores amigos le ofreciese un cigarrillo; o respondió “Definitivamente sí”, “Probablemente sí” o “Probablemente no” si piensa en fumar un cigarrillo en algún momento durante los próximos 3 meses.

• **Nunca fumaron, pero piensan que podrían disfrutar de fumar un cigarrillo** - Encuestados que nunca han fumado tabaco que respondieron que están totalmente de acuerdo o de acuerdo con la afirmación “Creo que me gustaría fumar un cigarrillo”.

• **Fumadores actuales que no fueron impedidos de comprar cigarrillos por cuenta de su edad** - Encuestados que actualmente fuman cigarrillos y en los últimos 30 días previos a la encuesta nadie se negó a venderle cigarrillos debido a su edad.

• **Fumadores actuales que compraron cigarrillos por unidad -**

Encuestados que actualmente fuman cigarrillos que compraron cigarrillos por última vez por unidad.

<sup>VII</sup> Encuestados que actualmente fuman cigarrillos que compran cigarrillos por unidad “de vez en cuando”, “a menudo” o “muy a menudo”;

<sup>VIII</sup> Encuestados que actualmente fuman cigarrillos que informaron que es posible comprar cigarrillos por unidad.

• **Fumadores actuales que intentaron dejar de fumar en los últimos 12 meses -**

Encuestados que actualmente fuman tabaco y respondieron que intentaron dejar de fumar durante los 12 meses previos a la encuesta.

• **Fumadores actuales que alguna vez recibieron ayuda o asesoramiento de un programa o profesional para dejar de fumar -**

Encuestados que actualmente fuman tabaco y respondieron que recibieron ayuda o asesoramiento de un programa o profesional para dejar de fumar.

<sup>IX</sup> Encuestados que actualmente fuman cigarrillos y respondieron que recibieron ayuda o asesoramiento de un programa o profesional para dejar de fumar.

• **Exposición al humo de tabaco en el hogar -** Encuestados que respondieron que alguien ha fumado en su presencia dentro de su hogar en uno o más días en los 7 días previos a la encuesta.

• **Exposición al humo de tabaco en lugares públicos cerrados -**

Encuestados que respondieron que alguien ha fumado en su presencia en algún lugar público cerrado (ejemplos proporcionados por el país) que no sea su hogar en uno o más días en los 7 días previos a la encuesta.

<sup>X</sup> Encuestados que respondieron que alguien ha fumado en su presencia en lugares públicos cerrados en los 7 días previos a la encuesta.

• **Estudiantes que vieron a alguien fumar dentro de la escuela o en entornos abiertos del predio escolar -**

Encuestados que respondieron haber visto a alguien fumando dentro de la escuela o en entornos abiertos del predio escolar en los 30 días previos a la encuesta.

• **Estudiantes que advirtieron alguna publicidad o promoción de**

**productos de tabaco en los puntos de venta -** Encuestados que observaron algún anuncio o promoción de productos de tabaco en los puntos de venta entre aquellos que visitaron los puntos de venta en los 30 días previos a la encuesta.

<sup>XI</sup> Encuestados que respondieron haber visto “muchos” o “pocos” anuncios de tabaco en los puntos de venta.

• **Estudiantes a quienes algún representante de una empresa**

**tabacalera les ofreció un producto de tabaco sin costo -** Encuestados a los que alguna vez un representante de una compañía tabacalera les ha ofrecido un producto de tabaco sin costo.

<sup>XII</sup> Encuestados que alguna vez se les ofreció un cigarrillo gratis a ellos.

• **Fumadores actuales que pensaron en dejar de fumar debido a las**

**imágenes de advertencia sanitaria -** Encuestados que actualmente fuman tabaco y que respondieron que las advertencias sanitarias en los paquetes de cigarrillos los llevaron a pensar en dejar de fumar en los 30 días previos a la encuesta.

• **Estudiantes que definitivamente piensan que es difícil dejar de**

**fumar una vez que alguien comienza a fumar tabaco -** Encuestados que respondieron “definitivamente sí” pensaron que sería difícil dejar de fumar tabaco una vez que alguien comienza a fumar.

• **Estudiantes que piensan que el humo de tabaco ajeno es nocivo para**

**ellos -** Encuestados que respondieron “definitivamente sí” cuando se les preguntó si el humo del tabaco que fuman otras personas es perjudicial para ellos.

<sup>XIII</sup> Encuestados que respondieron “definitivamente sí” cuando se les preguntó si el humo de los cigarrillos de otras personas es perjudicial para ellos.

• **Estudiantes que apoyan la prohibición de fumar en lugares públicos**

**cerrados -** Encuestados que respondieron estar a favor de la prohibición de fumar en los lugares públicos cerrados.

<sup>XIV</sup> Encuestados que respondieron estar a favor de la prohibición de fumar en los lugares públicos.

## PRODUCTOS

• **Productos de tabaco fumado** incluye los cigarrillos manufacturados, los cigarrillos liados a mano, cigarrillos kretek, pipas, puros, minipuros o puritos, pipas de agua o shisha, bidis y cualquier otra forma de producto de tabaco que se fuma.

• **Productos de tabaco sin humo** incluyen productos de tabaco sin combustión o pirólisis en el momento de su uso. Pueden ser masticados, inhalados o colocados entre los dientes y la encía, como el tabaco de mascar, snus, tabaco de aspirar o rape, chimó, gutka, betel quid con tabaco, dip, etc.

• **Shisha** es una pipa de agua usada para fumar tabaco y otras sustancias. También se conoce como narguile, goza y hookah.

• **Cigarrillos electrónicos** son dispositivos electrónicos que generalmente contienen un líquido a base de nicotina que se vaporiza e inhala. También se conocen como sistemas electrónicos de administración de nicotina y sistemas similares sin nicotina (SEAN/SSSN). Algunos se parecen a cigarrillos y otros se parecen a bolígrafos o pequeñas pipas. Son dispositivos que funcionan con baterías que producen vapor en lugar de humo.

PREVALENCIA

SUSCEPTIBILIDAD

ACCESO Y DISPONIBILIDAD

CESACIÓN

EXPOSICIÓN AL HUMO DE TABACO

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES

MUESTRA Y TASA DE RESPUESTA TOTAL

# REFERENCIAS

1. Global Youth Tobacco Survey Collaborative Group. Global Youth Tobacco Survey (GYTS): implementation instructions, version 1.1. Atlanta GA: Centers for Disease Control and Prevention; 2014.
2. Asma S, Mackay J, Song SY, Zhao L, Morton J, Palipudi KM, et al. The GATS Atlas Global Adult Tobacco Survey. Atlanta GA: CDC Foundation; 2015.
3. Organización Panamericana de la Salud. Informe sobre el control del tabaco en la Región de las Américas. Washington DC: OPS; 2018.

# LIMITACIONES

Los datos de la GYTS están sujetos a algunas limitaciones. El GYTS es una encuesta escolar y, por lo tanto, sus resultados son representativos de todos los estudiantes de 13 a 15 años. En consecuencia, la GYTS no es representativa de todos los jóvenes de 13 a 15 años de los países o sitios participantes. Aunque las tasas de respuesta de los estudiantes fueron altas en la mayoría de los países (17 de los 29 países tuvieron tasas de respuesta total  $\geq 80\%$ ), estos datos solo se refieren a los jóvenes que estuvieron en la escuela el día que la encuesta fue aplicada. Los datos son producidos en base al auto-reporte de los estudiantes que pueden haber exagerado o minimizado sus respuestas sobre sus comportamientos o actitudes.

Si bien la metodología estandarizada de selección de las muestras y de adaptación del cuestionario permite generar datos comparables en todos los países, este análisis debe tratarse con cautela, ya que las encuestas fueron realizadas por los países en diferentes años.

En 2012, el Grupo Colaborativo de la Encuesta Mundial Sobre Tabaco en Jóvenes revisó y modificó el Cuestionario Básico de la GYTS. El conjunto de indicadores presente en este folleto se basa en la versión actualizada de la GYTS. Debido a las pequeñas diferencias en los formatos de las preguntas, para los países que realizaron la encuesta antes de 2013, los resultados de algunos indicadores no están disponibles, o se identifican las cifras presentadas y en la nota técnica se presentan detalles adicionales relacionados con las diferencias entre los cuestionarios.

# AGRADECIMIENTOS

Este folleto fue producido por la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS). Jóvenes y Tabaco en la Región de las Américas – Resultados de la Encuesta Mundial sobre Tabaco en Jóvenes (2010-2017) se realizó con fondos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos de América.

Más información sobre el control de tabaco en la página web de la OPS/OMS: [www.paho.org](http://www.paho.org)

Más información sobre la GYTS y el GTSS en la página web Portal GTSSData: <https://www.cdc.gov/tobacco/global/gtss/gtssdata/index.html>

Se publica también en inglés  
Youth and Tobacco in the Region of the Americas.  
Results from the Global Youth Tobacco Survey (2010-2017)  
Document Number: PAHO/NMH/18/046

Jóvenes y Tabaco en la Región de las Americas. Resultados de la Encuesta Mundial sobre Tabaco en Jóvenes (2010 - 2017)

Número de documento: OPS/NMH/18/046

© **Organización Panamericana de la Salud 2018**

Todos los derechos reservados. Las publicaciones de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) están disponibles en su sitio web en ([www.paho.org](http://www.paho.org)). Las solicitudes de autorización para reproducir o traducir, íntegramente o en parte, alguna de sus publicaciones, deberán dirigirse al Programa de Publicaciones a través de su sitio web ([www.paho.org/permissions](http://www.paho.org/permissions)).

**Forma de cita propuesta.** Organización Panamericana de la Salud. Jóvenes y Tabaco en la Región de las Americas. Resultados de la Encuesta Mundial sobre Tabaco en Jóvenes (2010 - 2017). Washington, D.C.: OPS; 2018.


**Catalogación en la Fuente:** Puede consultarse en <http://iris.paho.org>.

Las publicaciones de la Organización Panamericana de la Salud están acogidas a la protección prevista por las disposiciones sobre reproducción de originales del Protocolo 2 de la Convención Universal sobre Derecho de Autor. Reservados todos los derechos.

Las denominaciones empleadas en esta publicación y la forma en que aparecen presentados los datos que contiene no implican, por parte de la Secretaría de la Organización Panamericana de la Salud, juicio alguno sobre la condición jurídica de países, territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni respecto del trazado de sus fronteras o límites.

La mención de determinadas sociedades mercantiles o de nombres comerciales de ciertos productos no implica que la Organización Panamericana de la Salud los apruebe o recomiende con preferencia a otros análogos. Salvo error u omisión, las denominaciones de productos patentados llevan en las publicaciones de la OPS letra inicial mayúscula.

La Organización Panamericana de la Salud ha adoptado todas las precauciones razonables para verificar la información que figura en la presente publicación, no obstante lo cual, el material publicado se distribuye sin garantía de ningún tipo, ni explícita ni implícita. El lector es responsable de la interpretación y el uso que haga de ese material, y en ningún caso la Organización Panamericana de la Salud podrá ser considerada responsable de daño alguno causado por su utilización.



**Organización  
Panamericana  
de la Salud**



**Organización  
Mundial de la Salud**  
OFICINA REGIONAL PARA LAS **Américas**