



INDICADORES DE ALTO NIVEL

Reducción del número de muertes por TB en 90% para 2030*	Línea Base 2015	Hito 2020	Meta 2030
Datos estimados	25.100	16.300	2.500



Reducción de la tasa de incidencia por TB en 80% para 2030*	Línea Base 2015	Hito 2020	Meta 2030
Estimados x 100.000 hab.	27,3	21,8	5,5



Familias afectadas por TB que enfrentan gastos catastróficos por la TB (%)	Línea Base 2015	Hito 2020	Meta 2030
	ND**	0%	0%

*En comparación con 2015

** No disponible

Número de muertes notificadas por TB.

Estadísticas vitales 2017

País	Muertes 2017***
Brasil	6.376
México	2.535
Perú	1.617
Colombia	1.308
Argentina	706
Ecuador	594
Estados Unidos de América	562
Chile	438
Guatemala	337
Panamá	280
Paraguay	218
Nicaragua	153
Canadá	106
Uruguay	74
Cuba	48
Costa Rica	43
Puerto Rico	5
Total	15.400

*** Incluye casos TB/VIH

- 17 países notificaron 15.400 defunciones por TB a través de sus estadísticas vitales en 2017. Muchas de estas muertes pudieron ser evitadas.
- En 2018 la brecha en la detección de casos por TB en la Región fue de 53.500.
- En los últimos 5 años la tasa de incidencia se ha incrementado 1,5% por año. Para lograr el hito 2020 de las metas de la Estrategia Fin de la TB se requiere un descenso de 12% anual.
- Es necesario que los países realicen encuestas sobre los gastos catastróficos que las familias afectadas deben afrontar.

ESTRATEGIA FIN DE LA TB - INDICADORES PRIORITARIOS

INDICADOR		VALOR 2018	META 2025
Cobertura de tratamiento anti-TB*		81%	≥ 90%
Tasa de éxito de tratamiento	Nuevos y recaídas (2017)	76%	≥ 90%
	RR/MDR (2016)	59%	
Porcentaje de familias afectadas por TB que enfrentan gastos catastróficos por la TB		ND**	0%
Porcentaje de pacientes nuevos de TB que fueron diagnosticados mediante pruebas rápidas recomendadas por la OMS		18%	≥ 90%
Cobertura de tratamiento de infección latente por TB	menores de 5 años	56%	≥ 90%
	VIH	9%	≥ 90%
Cobertura de investigación de contactos		ND**	≥ 90%
Cobertura de pacientes de TB con resultados de pruebas de sensibilidad a drogas		35%	100%
Cobertura de tratamiento con nuevos medicamentos anti-TB		ND**	≥ 90%
Porcentaje de pacientes con TB que conocen su estado de VIH		82%	100%
Tasa de letalidad por TB		7%***	≤ 5%

* Calculado sobre el número estimado de casos incidentes

** No disponible

*** Valor correspondiente a 2017

Recomendaciones para acelerar el avance hacia el fin de la TB en las Américas:

1. Mejorar y/o acelerar la implementación y expansión del diagnóstico temprano con las nuevas pruebas rápidas moleculares.
2. Promover el estudio de contactos, principalmente en los menores de 15 años.
3. Acelerar la implementación de los nuevos esquemas de TB-MDR y la introducción de medicamentos dispersables pediátricos para mejorar los resultados del tratamiento de TB.
4. Aumentar el trabajo con poblaciones vulnerables y sobre los determinantes sociales con actividades interprogramáticas e intersectoriales centradas en las personas y en la comunidad.
5. Promover los abordajes especiales como la Iniciativa de control de la TB en Grandes Ciudades, el Frente Parlamentario de Tuberculosis y expansión de la investigación operativa.
6. Cubrir las brechas financieras existentes con recursos sostenibles, reduciendo la dependencia de fondos externos.