

PRÉCAUTION D'ISOLEMENT – GOUTTELETTES

MASQUE

- masque chirurgical en cas de soins directs aux patients (<1 mètre)
- s'assurer que le masque chirurgical est correctement ajusté



- chambre individuelle si possible
- chambre partagée avec séparation d'un mètre entre les lits
- toujours garder la porte fermée



- éviter le transfert des patients vers d'autres secteurs de l'hôpital
- si le transfert est nécessaire, le patient doit porter un masque chirurgical à tout moment en dehors de la chambre

BLOUSE

- à utiliser en cas de risque d'éclaboussures et de contact avec des sécrétions
- utiliser si possible une blouse imperméable si un contact étendu avec les sécrétions est anticipé



hygiène des mains avant et après le contact avec le patient

GANTS

- usage unique contre le risque d'éclaboussures ou de contact avec des sécrétions



LUNETTES DE PROTECTION

- s'il y a un risque d'éclaboussures
- peuvent être remplacées par un écran facial

PRÉCAUTION D'ISOLEMENT – AÉROSOLS

MASQUE

- avant d'entrer dans la chambre, mettre un respirateur haute efficacité (n95, pff2 ou équivalent)
- s'assurer que le masque chirurgical est correctement ajusté



BLOUSE

- à utiliser en cas de risque d'éclaboussures et de contact avec des sécrétions
- utiliser si possible une blouse imperméable si un contact étendu avec les sécrétions est anticipé



hygiène des mains avant et après le contact avec le patient

GANTS

- usage unique contre le risque d'éclaboussures ou de contact avec des sécrétions



LUNETTES DE PROTECTION

- s'il y a un risque d'éclaboussures
- peuvent être remplacées par un écran facial



- chambre individuelle si possible
- chambre partagée avec séparation d'un mètre entre les lits
- toujours garder la porte fermée



- éviter le transfert des patients vers d'autres secteurs de l'hôpital
- si le transfert est nécessaire, le patient doit porter un masque chirurgical à tout moment en dehors de la chambre

PRÉCAUTION D'ISOLEMENT – CONTACT

BLOUSE

- à usage individuel, par patient
- blouse jetable non nécessaire



hygiène des mains
avant et après le
contact avec le
patient

GANTS

- usage unique
- doivent être enfilés avant d'entrer dans la chambre
- doivent rester dans la chambre après la visite



MASQUE

- dans toutes les situations indiquées par les précautions de sécurité



- chambre individuelle si possible
- chambre partagée avec séparation d'un mètre entre les lits
- toujours garder la porte fermée
- les patients ont besoin d'une salle de bain pour leur usage exclusif



- éviter le transfert des patients vers d'autres secteurs de l'hôpital

LUNETTES DE PROTECTION

- dans toutes les situations indiquées par les précautions standard



PRÉCAUTION D'ISOLEMENT – GOUTTELETTES

MASQUE

- masque chirurgical en cas de soins directs aux patients (<1 mètre)
- s'assurer que le masque chirurgical est correctement ajusté



- chambre individuelle si possible
- chambre partagée avec séparation d'un mètre entre les lits
- toujours garder la porte fermée



- éviter le transfert des patients vers d'autres secteurs de l'hôpital
- si le transfert est nécessaire, le patient doit porter un masque chirurgical à tout moment en dehors de la chambre

BLOUSE

- à utiliser en cas de risque d'éclaboussures et de contact avec des sécrétions
- utiliser si possible une blouse imperméable si un contact étendu avec les sécrétions est anticipé



hygiène des mains avant et après le contact avec le patient

GANTS

- usage unique contre le risque d'éclaboussures ou de contact avec des sécrétions



LUNETTES DE PROTECTION

- s'il y a un risque d'éclaboussures
- peuvent être remplacées par un écran facial



Organisation
Panaméricaine
de la Santé



Organisation
mondiale de la Santé
BUREAU RÉGIONAL DES
Amériques

PRÉCAUTION D'ISOLEMENT – AÉROSOLS

MASQUE

- avant d'entrer dans la chambre, mettre un respirateur haute efficacité (n95, pff2 ou équivalent)
- s'assurer que le masque chirurgical est correctement ajusté



BLOUSE

- à utiliser en cas de risque d'éclaboussures et de contact avec des sécrétions
- utiliser si possible une blouse imperméable si un contact étendu avec les sécrétions est anticipé



hygiène des mains avant et après le contact avec le patient

GANTS

- usage unique contre le risque d'éclaboussures ou de contact avec des sécrétions



LUNETTES DE PROTECTION

- s'il y a un risque d'éclaboussures
- peuvent être remplacées par un écran facial



- chambre individuelle si possible
- chambre partagée avec séparation d'un mètre entre les lits
- toujours garder la porte fermée



- éviter le transfert des patients vers d'autres secteurs de l'hôpital
- si le transfert est nécessaire, le patient doit porter un masque chirurgical à tout moment en dehors de la chambre

PRÉCAUTION D'ISOLEMENT – CONTACT

BLOUSE

- à usage individuel, par patient
- blouse jetable non nécessaire



hygiène des mains
avant et après le
contact avec le
patient

GANTS

- usage unique
- doivent être enfilés avant d'entrer dans la chambre
- doivent rester dans la chambre après la visite



MASQUE

- dans toutes les situations indiquées par les précautions de sécurité



- chambre individuelle si possible
- chambre partagée avec séparation d'un mètre entre les lits
- toujours garder la porte fermée
- les patients ont besoin d'une salle de bain pour leur usage exclusif



- éviter le transfert des patients vers d'autres secteurs de l'hôpital

LUNETTES DE PROTECTION

- dans toutes les situations indiquées par les précautions standard



Organisation
Panaméricaine
de la Santé



Organisation
mondiale de la Santé
BUREAU RÉGIONAL DES
Amériques