

Programme Elargie de Vaccination

POLITIQUE DE VIAL MULTI-DOSE ENTAMÉS

Pour vaccins pré-qualifiés par l'OMS

Vaccins liquides
Jusqu'à

28 jours

Après l'ouverture
du flacon

- IPV •bOPV
- DTP •TT •DT •Td
- Hépatite B •Influenza
- Varicelle (Vérifier la présentation/fournisseur)
- Formules liquides pour vaccins contre Hib



Vaccins lyophilisés
Jusqu'à

6 heures

Après avoir été reconstitués

- BCG •Fièvre jaune •RR
- Fièvre jaune
- Varicelle (Vérifier la présentation/fournisseur)
- Formule lyophilisé du vaccin contre Hib

LES ACTIONS À RÉALISER



Utiliser avant la date d'expiration



Ecrire la date et l'heure d'ouverture
du vial



Stocker et transporter entre +2 °C et
+8 °C



Manipuler en tenant compte de
pratiques aseptiques adéquates



Lire les instructions et recommanda-
tions du fabricant



Ne pas utiliser si le capuchon de
la bouteille a été submergé dans
l'eau des accumulateurs de froid



Il est interdit de laisser une
aiguille insérée dans le bouchon
de la bouteille



Il est interdit de pré-charger les
seringues avec des vaccins

RECOMMANDATION:

Pendant la fin de semaine ou en cas de panne de
courant, d'urgence ou d'autres événements qui pour-
raient affectés la chaîne froide, vous devez:

- Conditionner les paquets froids correctement et les
placer à l'intérieur du thermos
- Emballer et conserver les vaccins dans les thermos.
 - Placer un thermomètre à l'intérieur du thermos
 - Placer le thermos dans le réfrigérateur



Organisation
panaméricaine
de la Santé



BUREAU RÉGIONAL DES

Organisation
mondiale de la Santé
Amériques