

Resumen de la situación del cólera en la Región

En **Cuba**, entre la semana epidemiológica (SE) 27 de 2012 y la SE 34 de 2013, se registraron 678 casos de cólera incluyendo tres defunciones. No se han reportado nuevos casos desde el 24 de agosto de 2013.

En **Haití**, desde el inicio de la epidemia (octubre 2010) y hasta la SE 6 de 2014, se registraron 699.197 casos de cólera, de los cuales 391.074 fueron hospitalizados (55,9%) y 8.549 fallecieron. La tasa de letalidad acumulada se mantiene en 1,2%, aunque con variaciones que oscilan entre el 4,5% en el departamento de Sud Est al 0,6% en Port-au-Prince.

En las seis primeras semanas del 2014, se registraron 2.536 casos de cólera y 18 defunciones (tasa de letalidad acumulada para el 2014 de 0,7%). Registrándose un promedio semanal de 422 casos y 3 defunciones, cifra considerablemente menor a la registrada en el 2013 (con un promedio semanal de 1.140 casos y 9 defunciones).

Aunque en las últimas semanas del 2013 se observó una tendencia creciente en el número de casos, coincidente con la temporada de lluvias, en estas seis primeras semanas se registra una tendencia decreciente tanto en el número de casos como de defunciones.


En **México**, de la SE 37 a la SE 51 del 2013 se registraron 187 casos de infección por *Vibrio cholerae* O:1 Ogawa toxigénico, incluido un fallecimiento. No se han reportado nuevos casos desde el 15 de noviembre de 2013.

En **República Dominicana**, desde el inicio de la epidemia (noviembre de 2010) y hasta la SE 6 de 2014, se registraron 31.521 casos sospechosos de cólera, de los cuales 467 fallecieron.

Entre la SE 1 y la SE 6 del 2014, se registraron 46 casos sospechosos de cólera y ninguna defunción, con una tendencia decreciente en el número de casos. Esta cifra es considerablemente menor al número de nuevos casos registrados en el mismo periodo del 2013 (646 casos y 8 defunciones).

Dos provincias, Santo Domingo y Santiago registran el 65% de los casos notificados en estas primeras semanas del 2014.

Figura. Casos sospechosos de cólera, por semana epidemiológica. República Dominicana, semana epidemiológica (SE) 1 de 2013 a SE 4 de 2014.



Fuente: Ministerio de Salud de la República Dominicana. Dirección General de Epidemiología. Boletín epidemiológico.

Recomendaciones

La Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) recuerda a los Estados Miembros que se mantienen las recomendaciones formuladas en la [Alerta Epidemiológica](#) del 2 de noviembre del 2012.

Referencias

1. Ministère de la Santé Public et de la Population. Rapports journaliers du MSPP, Haiti, 2014. Disponible en: <http://mspp.gouv.ht/newsite/documentation.php?page=1¶m1=valu1¶m2=value2>
2. Boletín Epidemiológico de República Dominicana. Semana Epidemiológica 4, 2014. Disponible en: <http://digeprisalud.gob.do/boletines/boletines-semanales.html>

Enlaces de utilidad:

- Información sobre la declaración de la OMS en relación con los viajes y el comercio internacionales hacia y desde los países que están registrando cólera: <http://www.who.int/cholera/technical/prevention/choleratravelandtradeadvice231110.pdf>
- Información sobre cólera de la OMS: <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs107/es/index.html>
- Temas de salud de la OPS: Cólera. Disponible en: www.paho.org/colera