


SINTOMAS



O Ebola só pode ser transmitido a outros quando os sintomas começarem.



O intervalo de tempo da infecção até o aparecimento dos sintomas varia de **2 a 21 dias**, mas a média é de 8 a 10 dias.



Sintomas iniciais:

Febre
Dor de cabeça intensa
Dor muscular e nas articulações
Debilidade intensa
Dor de garganta



Sintomas avançados:

Diarreia
Vômitos
Dor de estômago
Sangramento inexplicável ou hematomas

TRATAMENTO

Se as pessoas com sintomas chegarem ao hospital no estágio inicial da doença, suas possibilidades de sobrevivência aumentam e a probabilidade de contagiar outros diminui.

As pessoas que se recuperam de uma infecção pelo Ebola desenvolvem anticorpos que os protegem de uma reinfecção com a mesma cepa do vírus.

Existem vários tratamentos experimentais em estudo para tratar a doença do vírus Ebola, mas estes ainda não estão disponíveis.



A recuperação da doença depende da resposta imunológica do paciente e de rápidos cuidados clínicos de suporte.

Iniciar a atenção clínica de suporte cedo—incluindo a hidratação para permitir que o sistema imunológico combata o vírus—aumenta a possibilidade do paciente de sobreviver.

EBOLA

O surto da doença por vírus Ebola de 2014 é o mais grave registrado até o momento, em termos do número de casos e mortes.

TRANSMISSÃO



Uma pessoa só pode infectar outra quando aparecerem os sintomas da doença.




As pessoas que não apresentam sintomas, como febre, dor de cabeça, dor abdominal, ou hemorragia, não são contagiosas.



O Ebola não é transmitido pelo ar nem por uma picada de mosquito.

A infecção pelo ebola só ocorre:



Através do contato direto com os fluidos corporais — especialmente o sangue, as fezes ou o vômito — de uma pessoa que está infectada pelo Ebola. tocar o corpo de uma pessoa que morreu de Ebola também pode resultar em uma infecção.



Através do contato com superfícies ou objetos contaminados. O risco de transmissão pode ser reduzido com adequada limpeza e desinfecção.



Organização
Pan-Americana
da Saúde



ESCRITÓRIO REGIONAL PARA AS

Organização
Mundial da Saúde
Américas

www.paho.org/ebola

O QUE DEVEM SABER OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE

Avaliação de pacientes pela possibilidade de infecção por Ebola

A suspeita de que um indivíduo possa estar com a doença do vírus Ebola depende dos fatores aqui enumerados. Qualquer paciente que apresente a combinação de fatores a seguir **deve ser imediatamente isolado**:



+



ou



=



Manifestação clínica
(sintomas)

Histórico de viagem

Histórico de exposição
à doença

Isolamento

É essencial adotar rigorosas medidas de controle de infecções para evitar uma maior propagação da doença.



Isolamento do paciente



Acesso e uso correto dos equipamentos de proteção pessoal por parte dos profissionais de saúde e procedimentos de desinfecção



Busca de contatos



Implementação coordenada de medidas de saúde pública de forma proporcional aos riscos



Educação da comunidade com informações claras, transparentes e atualizadas



Organização
Pan-Americana
da Saúde



ESCRITÓRIO REGIONAL PARA AS

Organização
Mundial da Saúde
Américas

www.paho.org/ebola

twitter.com/opsoms
facebook.com/pahowho
flickr.com/pahowho
youtube.com/pahopin