

Resumen de la situación del cólera en la Región de las Américas

En **Cuba**, no se han confirmado nuevos casos desde la semana epidemiológica (SE) 8 del 2014. En la SE 38, el Centro Nacional de Enlace de Chile notificó la confirmación de un caso de cólera por *Vibrio cholerae* O:1 serotipo Ogawa toxigénico, en un ciudadano chileno con antecedente de estadía en Cuba.

En **Haití**, desde el inicio de la epidemia (octubre del 2010) hasta la SE 44 del 2014, se registraron 711.442 casos de cólera, de los cuales 400.103 fueron hospitalizados (56%) y 8.646 fallecieron. La tasa de letalidad acumulada es de 1,2%, aunque con variaciones que oscilan entre el 4,4% en el departamento de Sud Est y el 0,6% en Port-au-Prince.

Si bien los casos registrados en el 2014 se encuentran muy por debajo a lo registrado en los años anteriores, se observa un incremento a partir de la SE 37. En efecto, desde la SE 1 a la SE 37 del 2014, el promedio de nuevos casos semanales osciló entre 250 y 290, y a partir de la SE 37 este número ascendió a 629.

En **México**, desde la SE 24 y hasta la SE 43 del 2014, el total de casos de cólera registrados en México asciende a 14. Todos los casos se registraron en el estado de Hidalgo.

Durante el 2013, se registraron a nivel nacional 176 casos de infección por *V. cholerae* O:1 Ogawa toxigénico, incluyendo una defunción.

En **República Dominicana**, desde el inicio de la epidemia (noviembre del 2010) hasta la SE 41 del 2014, se registraron 31.681 casos sospechosos de cólera, de los cuales 472 fallecieron.

Entre la SE 1 y la SE 41 del 2014, se registraron 209 casos sospechosos de cólera incluidas cinco defunciones, lo que significa un promedio mensual de 23 casos. Esta es una cifra mucho menor a la registrada en el mismo período en el 2013 (con un promedio mensual de 130 casos y un total de 13 defunciones), 2012 (promedio mensual de 557 casos y un total de 21 defunciones) y en el 2011 (promedio mensual de 240 casos y un total de 35 defunciones). En lo que va del año 2014, a nivel nacional, continúa la tendencia decreciente de nuevos casos registrados.

Recomendaciones

La Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) recuerda que se mantienen vigentes las orientaciones formuladas en la [Alerta Epidemiológica](#) del 2 de noviembre del 2012.

Referencias

1. Ministère de la Santé Public et de la Population. Rapports journaliers du MSPP, Haiti, 2014. Disponible en: <http://mspp.gouv.ht/newsite/documentation.php>
2. Boletín Epidemiológico de República Dominicana. Semana Epidemiológica 41, 2014. Disponible en: <http://digepisalud.gob.do/boletines/boletines-semanales.html>
3. Boletín Epidemiológico de la Dirección General de Epidemiología. Secretaría de Salud de México. Disponible en: http://www.epidemiologia.salud.gob.mx/dgae/boletin/intd_boletin.html

Enlaces de utilidad:

- Información sobre cólera de la OMS. Disponible en: <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs107/es/index.html>
- Temas de salud de la OPS: Cólera. Disponible en: www.paho.org/colera
- Información sobre la declaración de la OMS en relación con los viajes y el comercio internacional hacia y desde los países que están registrando cólera: <http://www.who.int/cholera/technical/prevention/choleratravelandtradeadvice231110.pdf>