

VACINE SUAS CRIANÇAS CONTRA O SARAMPO

A VACINA SALVA VIDAS

O SARAMPO PODE CAUSAR:

- PNEUMONIA
- DANO CEREBRAL PERMANENTE
- SURDEZ
- PARTO PREMATURO
- BEBÊS COM BAIXO PESO AO NASCER
- MORTE

SINTOMAS DO SARAMPO





- FEBRE ALTA
- CORRIMENTO NASAL
- TOSSE
- OLHOS VERMELHOS
- ERUPÇÕES NA PELE

Os sintomas podem aparecer entre 7 e 14 dias após a infecção.

O SARAMPO É MUITO CONTAGIOSO

A DOENÇA É TRANSMITIDA QUANDO UMA PESSOA INFECTADA RESPIRA, TOSSE OU ESPIRRA




O VÍRUS PODE FICAR NO AMBIENTE E NAS SUPERFÍCIES POR DUAS HORAS.



A PESSOA INFECTADA PODE CONTAGIAR OUTRAS ENTRE QUATRO DIAS ANTES E QUATRO DIAS DEPOIS DO SURGIMENTO DAS ERUPÇÕES NA PELE.



NOVE EM CADA DEZ PESSOAS NÃO VACINADAS PODEM SER INFECTADAS E APRESENTAR SINTOMAS DE SARAMPO.



QUANDO DEVEMOS VACINAR AS CRIANÇAS?

PRIMEIRA DOSE
[12 a 15 meses]

SEGUNDA DOSE
(18 meses*)



Durante surtos ou campanhas de atualização, a vacina pode ser aplicada a outros grupos de pessoas



A ÚNICA FORMA DE PREVENIR O SARAMPO É A VACINAÇÃO. A VACINA É SEGURA E EFICAZ.

Ou 4-6 anos de acordo com o esquema nacional

VACINE-SE ANTES DE VIAJAR!



HÁ SARAMPO EM MUITOS LUGARES DO MUNDO

Os viajantes, crianças ou adultos, que não sabem se estão vacinados, devem receber uma dose ao menos duas semanas antes de viajar.

SE VOCÊ ESTÁ COM SARAMPO



- Fique em casa ou no quarto do hotel, caso esteja em viagem
- Consulte um profissional de saúde
- Evite circular em locais públicos

PROTEJA-SE E PROTEJA QUEM VOCÊ AMA.

PARA EVITAR O SARAMPO,

#VACINE-SE