

2020

Weekly / Semanal **Influenza Report EW 43/ Reporte de Influenza SE 43**

Regional Update: Influenza & Other Respiratory Viruses /
Actualización Regional: Influenza y Otros virus respiratorios




**November 3, 2020
3 de noviembre de 2020**

*Data as of October 30, 2020/
Datos hasta el 30 de octubre de 2020*

*Prepared by PHE/IHM/Influenza Team/
Realizado por PHE/IHM/Equipo de Influenza*


FluNet

Percentage of reports to FluNet during the last four weeks (EW 40-43, 2020)
Porcentaje de informes a FluNet durante las últimas cuatro semanas (SE 40-43 de 2020)



FluID

Percentage of reports to FluID during the last four weeks (EW 40-43, 2020)
Porcentaje de informes a FluID durante las últimas cuatro semanas (SE 40-43 de 2020)



Map Production /Producción del mapa: PAHO/WHO/OPS/OMS.

Data Source /Fuente de datos:

Ministries of Health and National Influenza Centers of Member States Reports to the informatics global platforms [FluNet](#) and [FluID](#)
Informe de los Ministerios de Salud y los Centros Nacionales de Influenza de los Estados Miembros a las plataformas informáticas globales de [FluNet](#) y [FluID](#)

[Go to Index/](#)
[Ir al Índice](#)

WEEKLY REPORT DATA SOURCES

The information presented in this update is based on data provided by Ministries of Health and National Influenza Centers of Member States to the global informatics platforms

http://www.who.int/influenza/gisrs_laboratory/flunet/en/

and http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/fluid/en/;

and reports/weekly bulletins that Ministries of Health published on its website or shared with PAHO/WHO.

La información presentada en esta actualización se obtiene a partir de los datos notificados por los Ministerios de Salud y los Centros Nacionales de Influenza de los Estados Miembros a las plataformas informáticas globales de la OPS/OMS: [FluNet](#) y [Fluid](#); y de los informes/boletines semanales que los Ministerios de Salud publican en sus páginas web o comparten con OPS/OMS.

Note: Compared to the same period of the previous years, the current influenza surveillance data should be interpreted in light of the ongoing COVID-19 pandemic, which may have influence, to differing extents, health seeking behaviors, staffing/routines in sentinel sites, and testing capacities in Member States. The various social and physical distancing measures implemented by Member States to reduce SARS-CoV2 virus transmission may also have played a role in reducing substantially or even complete influenza virus transmission.

Nota: en comparación con el mismo período de los años anteriores, los datos actuales de vigilancia de la influenza deben interpretarse a la luz de la pandemia de COVID-19 en curso, que puede tener influencia en diferentes grados, comportamientos de búsqueda de salud, personal / rutinas en sitios centinela, y capacidades de prueba en los Estados miembros. Las diversas medidas de distanciamiento social y físico implementadas por los Estados Miembros para reducir la transmisión del virus SARS-CoV2 también pueden haber desempeñado un papel en la reducción sustancial o incluso completa, en la transmisión del virus de la influenza.

PAHO INFLUENZA LINKS

PAHO interactive data / Datos interactivos de la OPS:

PAHO FluNet: http://ais.paho.org/php/viz/ed_flu.asp

PAHO Fluid: <http://ais.paho.org/php/viz/flumart2015.asp>

Influenza regional reports / Informes regionales de influenza

In English: <https://www.paho.org/hq/influenzareport>

En español: www.paho.org/reportesinfluenza

Severe acute respiratory infections network - SARInet
Red de las infecciones respiratorias agudas graves - SARInet:

<http://www.sarinet.org>

[Go to Index/](#)
[Ir al Índice](#)

REPORT INDEX

ÍNDICE DE LA ACTUALIZACIÓN

Section	Content	Page
1	<u>Weekly Summary / Resumen Semanal</u>	5
2	<u>Overall Influenza and RSV circulation / Circulación general de los virus influenza y VRS</u>	7
3	<u>Overall ORV circulation and antigenic characterization of influenza viruses, 2017-20 / Circulación general de OVR y caracterización antigénica de los virus influenza, 2017-20</u>	8
4	<u>Weekly and Cumulative numbers / Números semanales y acumulados</u>	9
5	<u>Epidemiological and Virologic updates by country / Actualización epidemiológica y virológica por país</u>	10
6	<u>Acronyms / Acrónimos</u>	36

WEEKLY SUMMARY (ENGLISH)

North America: Influenza activity remained low in the subregion. In [Canada](#), the [United States](#), and in [Mexico](#), SARS-CoV-2 activity continued elevated and increasing at subnational level.

Caribbean: Influenza and other respiratory virus activity remained low in the subregion. In [Aruba](#), SARI activity continued elevated and above levels recorded for this period.

Central America: Influenza and other respiratory virus activity remained low in the subregion. In [Costa Rica](#), SARS-CoV-2 detections decreased slightly in recent weeks however SARI activity continued elevated.

Andean: Influenza and other respiratory virus activity remained low in the sub-region. In [Ecuador](#), SARS-CoV-2 detections continued to decrease but SARI activity continued at moderate levels. In [Peru](#), SARS-CoV-2 detections increased slightly this week and SARI activity continued at epidemic levels.

Brazil and Southern Cone: Influenza and other respiratory virus activity remained low in the subregion. In [Argentina](#), SARS-CoV-2 activity continued elevated and increasing. In [Paraguay](#), SARI activity continued at extraordinary levels and associated to elevated SARS-CoV-2 activity.

Note: PAHO/WHO encourages the testing of routine influenza surveillance and SARS-CoV-2 samples from sentinel and non-sentinel sources where resources are available and invites all countries/areas/territories to report this information (indicating the source, sentinel and/or non-sentinel) to routine, established regional and global platforms in a weekly basis. (See the [Operational considerations for COVID-19 surveillance using GISRS](#) guidance).

RESUMEN SEMANAL (ESPAÑOL)

América del Norte: la actividad de la influenza se mantuvo baja en la subregión. En [Canadá](#), [Estados Unidos](#) y [México](#), la actividad del SARS-CoV-2 continuó elevada y en aumento a nivel subnacional.

Caribe: la actividad de la influenza y otros virus respiratorios se mantuvo baja en la subregión. En [Aruba](#), la actividad de la IRAG continuó elevada y por encima de los niveles registrados para este período.


América Central: la actividad de la influenza y otros virus respiratorios se mantuvo baja en la subregión. En [Costa Rica](#), las detecciones de SARS-CoV-2 disminuyeron levemente en las últimas semanas, sin embargo, la actividad de la IRAG continuó elevada.

Andina: la actividad de la influenza y otros virus respiratorios se mantuvo baja en la subregión. En [Ecuador](#), las detecciones de SARS-CoV-2 continuaron disminuyendo, pero la actividad de IRAG continuó a niveles moderados. En [Perú](#), las detecciones de SARS-CoV-2 aumentaron levemente esta semana y la actividad de la IRAG continuó en niveles epidémicos.

Brasil y Cono Sur: la actividad de la influenza y otros virus respiratorios se mantuvo baja en la subregión. En [Argentina](#), la actividad del SARS-CoV-2 continuó elevada y en aumento. En [Paraguay](#), la actividad de la IRAG continuó a niveles extraordinarios y asociada a una elevada actividad de SARS-CoV-2.


Nota: La OPS / OMS promueve la prueba de muestras de vigilancia de influenza de rutina de fuentes centinelas y no centinelas, para el virus del SARS-CoV-2, donde haya recursos disponibles, e invita a todos los países / áreas / territorios a notificar esta información (idealmente indicando qué datos provienen de sitios centinela) a las plataformas regionales y globales de rutina y establecidas. (Véanse las [Consideraciones operativas para la vigilancia COVID-19 utilizando la guía GISRS](#)).

Influenza circulation by subregion, 2014-20 Circulación virus influenza por subregión, 2014-20



Respiratory syncytial virus (RSV) circulation by Subregion, 2014-20


Circulación virus respiratorio sincitial (VRS) por subregión, 2014-20



To view more lab data, view here. / Para ver más datos de laboratorio, vea aquí.


Other respiratory viruses (ORV) circulation by subregion, 2017-20

Circulación de otros virus respiratorios (OVR) por subregión, 2017-20



Genetic Characterization of Influenza Virus by Subregion, 2020

Caracterización Genética de los Virus Influenza por Subregión, 2020



Weekly and cumulative numbers of influenza and other respiratory viruses, by country and EW, 2020^{1,2} Números semanales y acumulados de influenza y otros virus respiratorios, por país y SE, 2020^{3,4}

EW 43, 2020 / SE 43, 2020																					
		N samples/ muestras	A(H3N2)	A(H1N1)pdm09	Flu A non-Subtyped	Flu A non-subtypable	B Victoria	B Victoria del 162/163	B Yamagata	B lineage no determinado	Influenza (+) %	Adenovirus	Parainfluenza	VSR	% RSV/VSR (+)	Coronavirus	SARS-CoV-2*	SARS-CoV-2 (+) %	Metapneumov.	Rinovirus*	% All Positive Samples (+)
North America/ América del Norte		40,548	0	0	1					1	0.0%	19	3	6	0%	0	17,638	3.8%	1	647	1.7%
Canada		1,054	0	0	1	0			0	0	0.1%	0	0	0	0%	0	27,308	29.4%	0	2	0.3%
Mexico		17,295	1	0	16		0		0	11	0.2%			1	0%	187,915	7.1%				0.2%
Caribbean/ Caribe			0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	26	5.4%	0	0	
Haiti			0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Jamaica			0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Suriname			0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Trinidad and Tobago			7								0.0%										0.0%
Central America/ América Central		51	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	0%	0	232	37.0%	0	0	0.0%
Costa Rica		2									0.0%					57	11.8%				0.0%
Guatemala			2	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	0%	0	102	12.1%	0	0	0.0%
Honduras																81	6.5%				0.0%
Nicaragua		137									0.0%										
Andean/ Andina		Bolivia	2	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	0%	0	1,082	100.0%	0	0	0.0%
Colombia		230	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	1	0	0%	0	20,453	12.7%	0	0	0.4%
Ecuador		29									0.0%					1,190	18.8%				0.0%
Peru		0														4,692	6.3%				
Brazil & Southern Cone/ Brasil y Cono Sur		Brazil	0																		
Chile		550									0.0%	6	1	0	0%						1.3%
Chile_IRAG		28	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	1	0	1	4%	0	14	42.4%	0	0	7.1%
Paraguay		0									0.0%					947	25.5%				
Uruguay		9									0.0%					3	7.7%				
Grand Total		59,944	1	0	16	1	0	0	0	12	0.1%	26	4	9	0%	0	261,740	7.6%	1	649	1.2%

These are the raw numbers provided in the country's FluNet update (Not the smoothed averages)
Estos son los números crudos proporcionados en la actualización FluNet del país (no los promedios suavizados)

*Please note blank cells indicate N/A.

*Por favor notar que las celdas en blanco indican N/A.

EW 42, 2020 / SE 42, 2020																		
		N samples/ muestras	Influenza A(H3N2)	Influenza A(H1N1)pdm09	Influenza A not subtyped/subl..	Influenza A not subtypable/no s..	Influenza B	Influenza B (%)	Adenovirus	RSV/VRS	% RSV/VSR (+)	Bocavirus*	Coronavirus*	SARS-CoV-2	Metapneumovir..	Rinovirus*	Parainfluenza*	% All Positive Samples (+)
Caribbean/ Caribe		Aruba	401					0	0.0%			0	0		0	21	0	5.2%
Brazil & Southern Cone/ Brasil y Cono Sur		Argentina	77	0	0	0		2	2.6%	1	0	0%	0	0	90,748	0	0	3.9%
Paraguay IRAG		8	0	0	0	0	0	0.0%	0	0	0%	0	0	124	0	0	0	0.0%
Grand Total		486	0	0	0	0	2	0.4%	1	0	0%	0	0	90,872	0	21	0	4.9%

EW 40, 2020 - EW 43, 2020 / SE 40, 2020 - SE 43, 2020																							
		N samples/ muestras	Influenza A(H3N2)	Influenza A/H1N1pdm09	Influenza A non-subtyped*	Influenza A non-subtypable*	B Victoria	B Victoria del 162/163	B Victoria del 162/164	Influenza B	Influenza B lineage undetermined	Influenza B (%)	Adenovirus*	Parainfluenza*	RSV/VSR*	% RSV/VSR (+)	Bocavirus*	Coronavirus*	SARS-CoV-2	Metapneumo..	Rinovirus*	% All Positive Samples (+)	
North America/ América del Norte		37,921	0	0	0	0				0	0	0.0%	22	1	5	0.0%	0	4	12,800	0	806	2.2%	
Canada		1,424	0	1	0	0				0	0	0.1%	0	0	1	0.1%	0	0	41,293	0	1	0.2%	
Mexico		18,429	0	0	20	0				0	19	0.2%	0	0	6	0.0%	0	0	136,150	0	0	0.2%	
Caribbean/ Caribe		Aruba	359	0	0	0	0			0	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	10	2.8%		
Haiti		95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	27	0	0	0.0%	
Suriname		3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0	1	33.3%	0	0	0	0	0	33.3%	
Trinidad and Tobago		2	0	0	0	0				0	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	
Central America/ América Central		112	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	0.0%	0	0	0	454	0	6	10.7%	
Costa Rica		19	0	0	0	0				0	0	0.0%	1	0	0	0	0	0	211	0	4	26.3%	
Guatemala		15	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	0.0%	1	0	1,707	0	0	0.7%		
Honduras		89	0	0	0	0				0	0	0.0%	0	0	2	2.2%	0	0	97	0	0	2.2%	
Andean/ Andina		Bolivia	7	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	0.0%	0	0	0	2,896	0	0	0.0%	
Colombia		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	1	0	3	10.0%	0	0	12,077	0	0	13.3%		
Ecuador		28	0	0	0	0				0	0	0.0%	0	0	0	0.0%	0	0	1,217	0	0	0.0%	
Brazil & Southern Cone/ Brasil y Cono Sur		Argentina	149	0	0	0	1			0	1	13.1%	1	0	0	0.0%	0	0	88,570	0	0	2.0%	
Brazil		2,011	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	0.0%	0	0	1	0	3	0.1%		
Chile		882	0	0	0	0				0	0	0.0%	1	0	3	0.3%	0	0	1	0	0	0.6%	
Chile_IRAG		43	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	0.0%	0	0	26	0	0	0.0%		
Paraguay		157	0	0	0	0				0	0	0.0%	0	0	0	0.0%	0	0	0	1,163	0	0	0.0%
Paraguay IRAG		10	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	0.0%	0	0	0	181	0	0	0.0%	
Uruguay		10	0	0	0	0				0	0	0.0%	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	0.0%	
Grand Total		61,795	0	1	20	1	0	0	0	20	0.1%	26	1	21	0.0%	1	4	298,870	1	830	1.5%		

Total Influenza B, EW 40, 2020 - 43, 2020

	Influenza B	B Victoria	B Victoria del 162/163	B Victoria del 162/164	B Yamagata	B lineage non-determ..	% B Victoria	% B Vic del 162/163	% B Vic del 162/164	% B Yamagata
North America/ América del Norte	78	1	0	0	0	0	100%			
Caribbean/ Caribe	0	0	0	0	0	0				0%
Central America/ América Central	1	0	0	0	0	2				
Andean/ Andina	0	0	0	0	0	0				
Brazil & Southern Cone/ Brasil y Cono Sur	4	3	0	0	0	1	100%</			

EPIDEMIOLOGIC AND VIROLOGIC UPDATE OF INFLUENZA & OTHER RESPIRATORY VIRUSES BY COUNTRY


ACTUALIZACIÓN EPIDEMIOLÓGICA Y VIROLÓGICA DE INFLUENZA Y OTROS VIRUS RESPIRATORIOS POR PAÍS

North America / América del Norte

Canada / Canadá


- During EW 43, few influenza detections (two samples) were recorded with influenza A and B viruses co-circulating (Graph 1). Few respiratory syncytial virus (RSV) detections were recorded, RSV activity continued very low with co-circulation of rhinovirus and adenovirus, among other respiratory viruses. During EW 43, SARS-CoV-2 percent positive remained the same compared to the last week, 3% (Graph 2). As of November 2, among 9 597 564 persons tested for SARS-CoV-2, 240 263 (2.5%) were positive; the provinces of Quebec (108 018), Ontario (77 655), Alberta (27 664), and British Columbia (15 501) reported the highest number of COVID-19 cases (Graph 3). The percentage of visits to healthcare professionals due to ILI (0.4%) was similar to previous weeks and was below the average for this time of year (1.2%) (Graph 4). / En la SE 43, se registraron pocas detecciones de influenza (dos muestras) con la circulación concurrente de los virus influenza A y B (Gráfico 1). Se registraron pocas detecciones de virus respiratorio sincitial (VRS), la actividad del VSR continuó muy baja con la circulación concurrente de rinovirus y adenovirus, entre otros virus respiratorios. Durante la SE 43, el porcentaje de positivos para SARS-CoV-2 se mantuvo igual en comparación con la semana pasada, 3% (Gráfico 2). Al 2 de noviembre, de 9 597 564 personas sometidas a la prueba del SARS-CoV-2, 240 263 (2,5%) dieron positivo; las provincias de Quebec (108 018), Ontario (77 655), Alberta (27 664) y Columbia Británica (15 501) notificaron el mayor número de casos de COVID-19 (Gráfico 3). El porcentaje de visitas a profesionales sanitarios por ETI (0,4%) fue similar al de semanas anteriores y se situó por debajo de la media para esta época del año (1,2%) (Gráfico 4).

Graph 1. Canada: Influenza virus distribution, EW 43, 2015 – 20
Distribución de virus de influenza, SE 43, 2015 – 20



Graph 3. Canada: Number of COVID-19 total cases in Canada on November 2, 2020


Número total de casos de COVID-19 en Canadá, al 2 de noviembre de 2020



Source: Coronavirus disease (COVID-19): Outbreak update. <https://www.canada.ca/en/public-health>


Graph 2. Canada: Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution

EW 43, 2015-20
Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2 SE 43, 2015-20



Graph 4. Canada: Percentage of ILI visits by sentinel sites, EW 35-43, 2020

Porcentaje de casos de ETI por sitio centinela , SE 35 a 43 de 2020




*To view more epi data, view [here](#). / Para ver más datos epi, vea [aquí](#).


United States / Estados Unidos

- During EW 43, influenza detections were reported, with the detection of influenza A(H3N2) among the influenza A viruses subtyped; influenza B viruses for which no lineage was determined co-circulated (Graph 1). The percentage of outpatient visits for influenza-like illness (1.2%) remained the same as the previous week's percentage and continued below the national baseline (2.6%) (Graph 2). In EW 43, 8.2% of reported deaths were due to pneumonia, influenza, or COVID-19, which is lower than the last week and above the epidemic threshold for EW 43 (5.9%) (Graph 3). From March 1 through October 24, 2020, 35 143 laboratory-confirmed COVID-19-associated hospitalizations were reported to the COVID-19-Associated Hospitalization Surveillance Network (COVID-NET), 94.5% had information on race and ethnicity. The rate for Hispanic or Latino (407.8) was the highest (Graph 4). / En la SE 43 se reportaron detecciones de influenza, con la detección de influenza A(H3N2) entre los virus influenza A, a los cuales se les determinó el subtipo; con la circulación concurrente de los virus influenza B para los que no se determinó ningún linaje (Gráfico 1). El porcentaje de visitas ambulatorias por enfermedad tipo influenza (1,2%) se mantuvo igual que el porcentaje de la semana anterior y continuó por debajo de la línea de base nacional (2,6%) (Gráfico 2). En la SE 43, 8,2% de las defunciones reportadas se debieron a neumonía, influenza o COVID-19, menor que la última semana y por encima del umbral epidémico de la SE 43 (5,9%) (Gráfico 3). Desde el 1 de marzo hasta el 24 de octubre de 2020, se notificaron 35 143 hospitalizaciones asociadas a COVID-19 confirmadas por laboratorio a la Red de vigilancia de hospitalizaciones asociadas a COVID-19 (COVID-NET), el 94,5% tenía información sobre raza y origen étnico. La tasa de hispanos o latinos (407,8) fue la más alta (Gráfico 4).

Graph 1. USA: Influenza virus distribution, EW 43, 2020
2019-2020 season
Distribución de virus de influenza, SE 43 de 2020
Temporada 2019-2020




Graph 3. USA: Pneumonia, influenza and COVID-19 mortality data as of October 29, 2020
Mortalidad por neumonía, influenza y COVID-19, datos al 29 de octubre de 2020




Source: COVIDView. <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov>

Graph 2. USA: Percentage of visits for ILI, EW 43, 2009-21
Porcentaje de visitas por ETI, SE 43, 2009-21



Graph 4. USA: Weekly COVID-19-associated hospitalization rates by age group, March 1–October 24, 2020
Tasa semanal de hospitalizaciones asociadas a COVID-19 por grupo de edad, 1 de marzo al 24 de octubre de 2020



Content source: [CDC - Coronavirus Disease 2019 \(COVID-19\)](https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nov)


*To view more epi data, view [here](#). / Para ver más datos epi, vea [aquí](#).

Mexico / México


- During EW 43, few influenza detections (one sample) were recorded with influenza A viruses circulating. Influenza and RSV activity remained at interseasonal levels (Graphs 1, 2, and 3). During EW 43, no RSV detections were recorded; few detections of rhinovirus were reported. SARS-CoV-2 percent positivity has fluctuated in recent weeks and was at 31% this week (Graph 2). One influenza-associated SARI/ILI case was reported and was associated with an influenza A(H1N1)pdm09 virus. No SARI/ILI deaths were recorded in EW 43 (Graphs 4 and 5). The five states with the highest cumulative number of laboratory-confirmed SARS-CoV-2 cases were Mexico City, Mexico State, Nuevo Leon, Guanajuato, and Veracruz (Graph 6). / En la SE 43, se registraron pocas detecciones de influenza (una muestra) con la circulación del virus influenza A. La actividad de la influenza y el VRS se mantuvo en niveles interestacionales (Gráficos 1, 2 y 3). Durante la SE 43, no se registraron detecciones de VRS; se notificaron pocas detecciones de rinovirus. El porcentaje de positividad para el SARS-CoV-2 ha fluctuado en las últimas semanas y fue del 31% esta semana (Gráfico 2). Se notificó un caso de IRAG / ETI asociado a influenza y se asoció con un virus influenza A(H1N1)pdm09. No se registraron muertes por IRAG / ETI en la SE 43 (Gráficos 4 y 5). Los cinco estados con el mayor número acumulado de casos de SARS-CoV-2 confirmados por laboratorio fueron Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Guanajuato y Veracruz (Gráfico 6).

Graph 1. Mexico: Influenza virus distribution, EW 43, 2015-20

Distribución de virus influenza, SE 43, 2015-20

**Graph 3.** Mexico: Percent positivity for influenza, EW 43, 2020 (compared to 2010-19)

Porcentaje de positividad de influenza, SE 43 de 2020 (comparado con 2010-19)

**Graph 5.** Mexico: SARI/ILI-influenza deaths, EW 43, 2020

Casos fallecidos por IRAG/ETI asociados a Influenza, SE 43 de 2020




Fuente: SINAVE/DCE/Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Influenza, acceso al 22/10/2020.

Graph 2. Mexico: Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution

EW 43, 2015-20

Distribución de virus influenza, VRS y SARS-CoV-2, SE 43, 2015-20

**Graph 4.** Mexico: SARI/ILI-influenza positive, EW 43, 2020


Casos de IRAG/ETI positivos a influenza, SE 43 de 2020



Fuente: SINAVE/DCE/Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Influenza, acceso al 22/10/2020.

Graph 6. Mexico: Cumulative number of laboratory-confirmed SARS-CoV-2 cases by state, EWs 2*- 43, 2020

Número acumulado de casos de SARS-CoV-2 confirmados por laboratorio por estado, SE 2*- 43 de 2020




* Epi week when the country started to report SARS-CoV-2

*To view more epi data, view [here](#). / Para ver más datos epi, vea [aquí](#).


Caribbean/ Caribe**Aruba**

- During EW 43, no influenza detections were reported, influenza A(H1N1)pdm09 and influenza B virus co-circulation was last recorded in EW 12 (Graph 1). Influenza percent positivity remained at baseline levels of activity. No detections of RSV have been recorded since EW 13; few samples of rhinovirus were recorded in recent weeks (Graphs 2 and 3). The number of severe acute respiratory infections (SARI) cases decreased compared to previous weeks, continued above levels observed in previous seasons (Graph 4). / Durante la SE 43, no se notificaron detecciones de influenza, la última vez que se registró la circulación concurrente de los virus influenza A(H1N1)pdm09 e influenza B fue en la SE 12 (Gráfico 1). El porcentaje de positividad de la influenza se mantuvo en los niveles basales de actividad. No se han registrado detecciones de VRS desde la SE 13; se registraron algunas muestras de rinovirus en las últimas semanas (Gráficos 2 y 3). El número de casos de infección respiratoria aguda grave (IRAG) disminuyó en comparación con las semanas previas, por encima de los niveles observados en temporadas anteriores (Gráfico 4).


Graph 1. Aruba. Influenza virus distribution EW, EW 43, 2015-20
Distribución de virus influenza por SE, SE 43, 2015-20




Graph 2. Aruba. Influenza and RSV distribution, EW 43, 2015-20
Distribución de virus influenza y VRS, SE 43, 2015-20



Graph 3. Aruba: RSV and other respiratory viruses distribution,
EW 43, 2015-20
Distribución del VRS y otros virus, SE 43, 2015-20



Graph 4. Aruba: Number of SARI cases, EW 43, 2018-20,
Número de casos IRAG, SE 43, 2018-20




*To view more epi data, view [here](#). / Para ver más datos epi, vea [aquí](#)


CARPHA

- During EW 43, influenza activity continued at baseline levels compared to previous seasons for the same time period; influenza A(H1N1)pdm09, A(H3N2), and B Yamagata viruses were detected in early March (Graph 1). RSV activity remained at baseline levels (Graph 2). Respiratory samples were received from Aruba and Trinidad and Tobago. / En la SE 43, la actividad de la influenza continuó en los niveles de referencia en comparación con temporadas anteriores durante el mismo período de tiempo; los virus influenza A(H1N1)pdm09, A(H3N2) y B/Yamagata se detectaron a principios de marzo (Gráfico 1). La actividad del VRS se mantuvo en niveles de referencia (Gráfico 2). Se recibieron muestras respiratorias de Aruba y Trinidad y Tobago.

Graph 1. CARPHA: Influenza virus distribution, EW 43, 2015-20
Distribución de virus influenza, SE 43, 2015-20



Graph 2. CARPHA: Influenza and RSV distribution, EW 43, 2015-20
Distribución de virus influenza y VRS, SE 43, 2015-20




To view more epi data, view [here](#). / Para ver más datos epi, vea [aquí](#).

- Guadeloupe:** During EW 43, 271 new COVID-19 cases were confirmed. The number of acute respiratory infections (ARI) teleconsultations decreased to 670 cases, lower than in EW 42 (Graph 1). **Saint-Martin:** During EW 43, 29 new COVID-19 cases were confirmed and five ARI teleconsultations were recorded, a decrease compared to the previous week (Graph 2). **Saint-Barthelemy:** Six new COVID-19 cases were confirmed during EW 43. Five ARI teleconsultations were recorded, an increased compared to the previous week (Graph 3). **Martinique:** As of EW 43, 3818 persons tested positive for COVID-19. The number of ARI consultations during EW 43 was 416, an increase in comparison to the previous week (224) (Graph 4). **Guiana:** As of October 29, 10 499 cases of COVID-19 were confirmed. The number of new cases hospitalized increased compared to previous weeks. The number of new hospitalizations increased at CHOG and CHK while decreased at CHC hospital center (Graph 5). / **Guadalupe:** en la SE 43 se confirmaron 271 nuevos casos de COVID-19. El número de teleconsultas por infecciones respiratorias agudas (IRA) disminuyó a 670 casos, menor que en la SE 42 (Gráfico 1). **San Martín:** en la SE 43, se confirmaron 29 nuevos casos de COVID-19 y se registraron cinco teleconsultas de IRA, una disminución respecto a la semana anterior (Gráfico 2). **San Bartolomé:** se confirmaron seis nuevos casos de COVID-19 en la SE 43. Se registraron cinco teleconsultas por IRA, un aumento respecto a la semana anterior (Gráfico 3). **Martinica:** hasta la SE 43, 3818 personas dieron positivo por COVID-19. El número de consultas de IRA en la SE 43 fue de 416, un aumento en comparación con la semana anterior (224) (Gráfico 4). **Guayana:** al 29 de octubre, se confirmaron 10 499 casos de COVID-19. El número de nuevos casos hospitalizados aumentó en comparación con las semanas anteriores. El número de nuevas hospitalizaciones aumentó en CHOG y CHK, mientras que disminuyó en el centro hospitalario de CHC (Gráfico 5).

Graph 1. Guadeloupe: Estimated number of clinically suggestive cases

of acute respiratory infections, EWs 13-43, 2020*


Número estimado de casos clínicamente sugestivos de infecciones respiratorias agudas, SE 13-43 de 2020

**Graph 2.** San Martin: Estimated number of clinically suggestive cases of acute respiratory infections, EWs 13-43, 2020*


Número estimado de casos clínicamente sugestivos de infecciones respiratorias agudas, SE 13-43 de 2020

**Graph 3.** Saint-Barthelemy: Estimated number of clinically suggestive cases of acute respiratory infections, EWs 13-43, 2020*


Número estimado de casos clínicamente sugestivos de infecciones respiratorias agudas, SE 13-43 de 2020

**Graph 4.** Martinique: Estimated number of clinically suggestive cases of acute respiratory infections, EWs 13-43, 2020*

Número estimado de casos clínicamente sugestivos de infecciones respiratorias agudas, SE 13-43 de 2020

**Graph 5.** French Guiana: Number of new COVID-19 hospitalizations by week and hospital*

Número de nuevas hospitalizaciones por COVID-19 por semana y hospital




* CHC: Centre Hospitalier de Cayenne, CHOG : Centre Hospitalier de l'Ouest Guyanais, CHK : Centre Hospitalier de Kourou.


* Point épidémio régional. Spécial COVID-19. GLP – MAF - BLM, MTQ, GUF/ Punto epidémico regional. Especial COVID-19. Disponible aquí: [GLP – MAF - BLM, MTQ, GUF](#)**To view more epi data, view [here](#). / Para ver más datos epi, vea [aquí](#).

- During EW 43, no influenza detections were recorded. Influenza A(H1N1)pdm09 and B/Victoria viruses circulation was last recorded in April (Graph 1). During 2020, respiratory syncytial virus detections have not been reported, with influenza activity at baseline levels. In EW 43, 5.4% (26) of samples tested positive for SARS-CoV-2, an increase compared to the previous week (Graph 2). Since EW 14, the influenza percent positive has been below the levels observed in past seasons for the same period (Graph 3). SARS-CoV-2 detections decreased slightly compared to the previous week (Graph 4). SARI hospitalizations decreased compared to the last week and remained at low levels of activity as compared to previous seasons for the same time (Graph 5). / En la SE 43 no se registraron detecciones de influenza. La circulación de los virus Influenza A(H1N1)pdm09 y B/Victoria se registró por última vez en abril (Gráfico 1). Durante 2020, no se han notificado detecciones de virus respiratorio sincitrial, con la actividad de la influenza en los niveles de referencia. En la SE 43, el 5,4% (26) de las muestras dieron positivo para SARS-CoV-2, un aumento en comparación con la última semana (Gráfico 2). Desde la SE 14, el porcentaje de influenza positiva ha estado por debajo de los niveles observados en temporadas pasadas para el mismo período (Gráfico 3). Las detecciones de SARS-CoV-2 disminuyeron ligeramente en comparación con la semana anterior (Gráfico 4). El número de hospitalizaciones por IRAG disminuyó comparado con la semana previa y se mantuvo en niveles bajos de actividad en comparación con temporadas anteriores para el mismo período (Gráfico 5).


Graph 1. Haiti: Influenza virus distribution EW 43, 2015-20
Distribución de virus influenza SE 43, 2015-20



Graph 3. Haiti: Percent positivity for influenza, EW 43, 2020
(compared to 2015-19)
Porcentaje de positividad de influenza, SE 43 de 2020
(comparado con 2015-19)




Graph 4. Haiti: Number of SARI cases, EW 43, 2020
(compared to 2017-19)
Número de casos de IRAG, SE 43 de 2020
(comparado con 2017-19)




*To view more epi data, view [here](#). / Para ver más datos epi, vea [aquí](#).

Graph 2. Haiti: Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution, EW 43, 2015-20
Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2, SE 43, 2015-20




Graph 4. Haiti: RSV and other respiratory viruses distribution, EW 43, 2019-20
Distribución del VRS y otros virus, SE 43, 2019-20




Jamaica

- In the last six months, there have been no detections of influenza. Co-circulation of influenza A(H1N1)pdm09 and B/Victoria viruses was reported in the first months of the year (Graph 1). During 2020, the circulation of the respiratory syncytial virus and other respiratory viruses has not been reported. No samples were recorded for SARS-CoV-2, in EW 43 (Graph 2). The percent positivity for influenza remained below the average seen in previous seasons (Graph 3). SARI hospitalizations/100 hospitalizations peaked in EW 15 at moderate levels of activity, decreased to baseline levels to increase again to moderate levels with a second peak in EW 37. Since then SARI cases/100 hospitalizations have fluctuated to increase slightly in EW 43, remaining at low levels of activity above levels observed in previous seasons for the same period (Graph 4). The number of pneumonia cases increased and was above the average of levels observed in previous seasons (Graph 5). ARI cases have increased in recent weeks remaining below the seasonal thresholds observed during previous seasons (Graph 6). / En los últimos seis meses, no han habido detecciones de influenza. Se notificó circulación concurrente de los virus influenza A(H1N1)pdm09 y B / Victoria en los primeros meses del año (Gráfico 1). Durante 2020, no se ha notificado la circulación de virus respiratorio sincitrial y otros virus respiratorios. No se registraron muestras para SARS-CoV-2, en la SE 43 (Gráfico 2). El porcentaje de positividad para la influenza se mantuvo por debajo del promedio observado en temporadas anteriores (Gráfico 3). Las hospitalizaciones por IRAG / 100 hospitalizaciones alcanzaron su punto máximo en la SE 15 a niveles moderados de actividad, disminuyeron a niveles basales para volver a aumentar a niveles moderados con un segundo pico en la SE 37. Desde entonces, los casos de IRAG / 100 hospitalizaciones han fluctuado para aumentar ligeramente en la SE 43, permaneciendo en niveles bajos de actividad por encima de los observados en temporadas anteriores para el mismo período (Gráfico 4). El número de casos de neumonía aumentó y se ubicó por encima del promedio de niveles observados en temporadas anteriores (Gráfico 5). Los casos de IRA han aumentado en las últimas semanas manteniéndose por debajo de los umbrales estacionales observados durante temporadas anteriores (Gráfico 6).


Graph 1. Jamaica: Influenza virus distribution, EW 43, 2015-20
Distribución de virus influenza SE 43, 2015-20




Graph 3. Jamaica: Percent positivity for influenza, EW 43, 2020
(compared to 2010-19)
Porcentaje de positividad de influenza, SE 43 de 2020
(comparado con 2010-19)




Graph 5. Jamaica: Number of pneumonia cases,
EW 43, 2014-20
Número de casos de neumonía, SE 43, 2014-2020




Graph 2. Jamaica: Influenza, RSV, and SARS-CoV-2
virus distribution, EW 43, 2015-20
Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2, SE 43, 2015-20



Graph 4. Jamaica: SARI hospitalizations/100 hospitalizations,
EW 43, 2020 (compared to 2011-19)
Hospitalizaciones de IRAG/100 hospitalizaciones, SE 43 de 2020
(comparado con 2011-19)



Graph 6. Jamaica: Number of ARI cases, EW 43, 2020
(compared to 2011-19)
Número de casos de IRA, SE 43 de 2020
(comparado con 2011-19)



*To view more epi data, view [here](#). / Para ver más datos epi, vea [aquí](#)

Puerto Rico

- During EW 43, influenza-like illness activity level was minimal; influenza activity remains low with influenza A(H1N1)pdm09 virus most frequently detected and co-circulation of influenza A(H3N2), influenza B/Victoria, and B/Yamagata detected in the previous month (Graph 1). The number of influenza positive cases (rapid test) reported in EW 43 was below the average number of cases observed in previous seasons during the same period (Graph2). The age group with the greatest number of influenza-confirmed cases was those aged 60 years and older; the distribution of influenza cases among the other age groups is shown in Graph 3. The influenza incidence rate per-100 000 population by municipality of residence is shown in Graph 4: the municipalities of Guánica and Peñuela had the highest influenza incidence rate**. / En la SE 43, el nivel de actividad de la enfermedad tipo influenza fue mínimo; la actividad de la influenza permanece baja con el virus de influenza A(H1N1)pdm09 detectado con mayor frecuencia y la circulación concurrente de influenza A(H3N2), influenza B/Victoria y B/Yamagata detectada en el mes anterior (Gráfico 1). El número de casos positivos de influenza (prueba rápida) reportados en la SE 43 estuvo por debajo del promedio de casos observados en temporadas anteriores durante el mismo período (Gráfico 2). El grupo de edad con el mayor número de casos confirmados de influenza fue el de 60 años y mayores; la distribución de los casos de influenza entre los otros grupos de edad se muestra en el Gráfico 3. La tasa de incidencia de influenza por 100 000 habitantes por municipio de residencia se muestra en el Gráfico 4: los municipios de Guánica y Peñuela tuvieron la mayor tasa de incidencia de influenza**.


Graph 1. Puerto Rico: Influenza-positive tests reported to CDC by Public Health Laboratories, EW 43, 2019-20[†]

Pruebas positivas para influenza informadas a los CDC por los Laboratorios de Salud Pública, SE 43, 2019-20[†]



Graph 3. Puerto Rico: Number of cases positive for influenza by age group, EW 43, 2020

Número de casos positivos para influenza por grupo de edad, SE 43 de 2020




† Influenza Positive Tests Reported to CDC by Public Health Laboratories, Puerto Rico.

** Departamento de Salud. Sistema de Vigilancia de Puerto Rico. [Salud Puerto Rico](#)

*To view more epi data, view [here](#). / Para ver más datos epi, vea [aquí](#).


Graph 2. Puerto Rico: Influenza-positive cases EW 43, 2020-21 Casos positivos para influenza SE 43, 2020-21



Graph 4. Puerto Rico: Influenza incidence rate per 100,000 population by municipality of residence, EW 43, 2020

Tasa de incidencia de influenza por 100.000 habitantes por municipio de residencia, SE 43 de 2020


Gráfica 2. Mapa de tasas de incidencia de influenza por municipio, semana 43




Saint Lucia / Santa Lucía

No influenza or respiratory syncytial virus detections have been reported in recent months; influenza A(H1N1)pdm09 viruses circulated during EW 11. Influenza percent positivity remained at baseline levels (Graphs 1 and 2). SARS-CoV-2 percent positive remained similar to the percent recorded in previous weeks with a few samples (one) reported the previous week (Graph2). During EW 42, three ILI cases among children < 5 years were reported to the respiratory surveillance system. Among persons aged >5 years and older, 12 new ILI cases were reported, lower compared to the number reported in 2019, for the same period (13) (Graphs 3 and 4). During EW 42, the number of SARI cases remained similar at baseline levels compared to previous seasons for the same period of the year (Graph 5). The age groups with the higher percentage of SARI cases were children aged 1-4 (36.4%). / No se han notificado detecciones de virus influenza o virus respiratorio sincitrial en los últimos meses; los virus influenza A(H1N1)pdm09 circularon durante la SE 11. El porcentaje de positividad de influenza permaneció en los niveles basales (Gráficos 1 y 2). El porcentaje de positivos para SARS-CoV-2 se mantuvo similar al porcentaje registrado en las semanas anteriores con algunas muestras (una) notificadas la semana anterior (Gráfico 2). En la SE 42 se notificaron al sistema de vigilancia respiratoria tres casos de ETI en menores de 5 años. En las personas de 5 años y más, se notificaron 12 casos nuevos de ETI, más bajo en comparación con el número informado en 2019, para el mismo período (13) (Gráficos 3 y 4). Durante la SE 42, el número de casos de IRAG se mantuvo similar en los niveles de referencia a temporadas anteriores para el mismo período del año (Gráfico 5). Los grupos de edad con mayor porcentaje de casos de IRAG fueron los niños de 1 a 4 años (36,4%).


Graph 1. Saint Lucia: Influenza virus distribution, EW 42, 2015-20




Graph 2. Saint Lucia: Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 virus distribution, EW 42, 2015-20




Graph 3. Saint Lucia: ILI case distribution by EW among the < 5 years of age, EW 42, 2020 (in comparison to 2016-19)



Graph 4. Saint Lucia: ILI case distribution by EW among the ≥ 5 years of age, EW 42, 2020 (in comparison to 2016-19)



Graph 5. Saint Lucia: Number of SARI cases, EW 42, 2020 (compared to 2016-19)




*To view more epi data, view [here](#). / Para ver más datos epi, vea [aquí](#).


Suriname / Surinam

- In EW 42, no influenza viruses were detected; influenza B and A(H1N1)pdm09 viruses circulated at the beginning of the year (Graph 1). No respiratory syncytial virus has been reported during 2020. Influenza percent positivity was at the lowest level observed in recent years. Since EW 23, no SARS-CoV-2 detections have been reported (Graphs 2 and 3). The proportion of SARI hospitalizations/100 hospitalizations decreased compared to previous weeks and was below the epidemic threshold, as observed in past seasons for the same period (Graph 5). No SARI-associated deaths were reported in the last five months. / En la SE 42 no se detectaron virus de influenza; los virus influenza A(H1N1)pdm09 y B circularon a principios del año (Gráfico 1). No se ha notificado virus sincitial respiratorio durante 2020. El porcentaje de positividad para la influenza estuvo en el nivel más bajo observado en los últimos años. Desde la SE 23, no se han notificado detecciones de SARS-CoV-2 (Gráficos 2 y 3). La proporción de hospitalizaciones por IRAG/100 hospitalizaciones disminuyó en comparación con las semanas previas, por debajo del umbral epidémico, como se observó en temporadas pasadas para el mismo período (Gráfico 5). No se reportaron muertes asociadas a IRAG en los últimos cinco meses.


Graph 1. Suriname: Influenza virus distribution, EW 42, 2015-20
Distribución de virus influenza, SE 42, 2015-20




Graph 3. Suriname: Percent positivity for influenza, EW 42, 2020
(compared to 2015-19)
Porcentaje de positividad de influenza, SE 42 de 2020
(comparado con 2015-19)



Graph 2. Suriname: Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 virus distribution,
EW 42, 2015-20
Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2, SE 42, 2015-20



Graph 4. Suriname: SARI cases/100 hospitalizations, EW 42, 2020
(compared to 2014-19)
Casos de IRAG por cada 100 hospitalizaciones, SE 42 de 2020
(comparado con 2014-19)




*To view more epi data, view [here](#). / Paraver más datos epi, vea [aquí](#).


Trinidad and Tobago

- During EW 43, no influenza detections were reported. In early March, influenza detections were recorded with influenza A(H1N1)pdm09, influenza B/Victoria, and B/Yamagata viruses co-circulating (Graph 1). Influenza percent positivity remained at baseline levels; few RSV detections were reported in recent weeks (Graphs 2 and 3). The number of SARI cases reported in past weeks was below levels observed in previous seasons (Graph 4). / En la SE 43, no se notificaron detecciones de influenza. A principios de marzo, se registraron detecciones de influenza con la circulación concurrente de los virus influenza A(H1N1)pdm09, influenza B/Victoria y B/Yamagata (Gráfico 1). El porcentaje de positividad de la influenza se mantuvo en los niveles basales; se notificaron pocas detecciones de VRS en las últimas semanas (Gráficos 2 y 3). El número de casos de IRAG reportados en las últimas semanas estuvo por debajo de los niveles observados en temporadas anteriores (Gráfico 4).


Graph 1. Trinidad and Tobago: Influenza virus distribution, EW 43, 2015-20
Distribución de virus influenza, SE 43, 2015-20




Graph 3. Trinidad and Tobago: RSV and other respiratory viruses distribution, EW 43, 2015-20
Distribución de VRS y otros virus respiratorios, SE 43, 2015-20



Graph 2. Trinidad and Tobago: Influenza and RSV distribution, EW 43, 2015-20
Distribución de virus influenza y VRS, SE 43, 2015-20



Graph 4. Trinidad and Tobago: Percentage of SARI cases, EW 43, 2020 (compared to 2018-19)
Porcentaje de casos de IRAG, SE 43 de 2020 (comparado con 2018-19)




*To view more epi data, view [here](#). / Para ver más datos epi, vea [aquí](#).

Central America / América Central**Costa Rica**


- During the past six months, no influenza or RSV detections have been recorded. Influenza A and B viruses circulation were last recorded in early March. Influenza percent positivity remained at baseline levels; SARS-CoV-2 percent positive decreased compared to the previous week at 38.0% (Graphs 1, 2, and 3). SARS-CoV-2 detections decreased compared to the last week (Graph 4). The three provinces with the highest cumulative proportion of SARS-CoV-2 cases recorded were Puntarenas, Limón, and San José. The number of severe acute respiratory infection (SARI) cases continued to decrease at moderate activity levels compared to previous seasons (Graph 5). Influenza-like illness visits continued elevated and decreased compared to past weeks (Graph 6). / Durante los últimos seis meses, no se han registrado detecciones de influenza o VRS. La circulación de los virus influenza A y B se registró por última vez a principios de marzo. El porcentaje de positividad para la influenza se mantuvo en los niveles iniciales; el porcentaje de positividad para SARS-CoV-2 disminuyó en comparación con la semana anterior en 38.0% (Gráficos 1, 2 y 3). Las detecciones de SARS-CoV-2 disminuyeron en comparación con la semana pasada (Gráfico 4). Las tres provincias con la mayor proporción acumulada de casos de SARS-CoV-2 registrados fueron Puntarenas, Limón y San José. El número de casos de infección respiratoria aguda grave (IRAG) continuó disminuyendo a niveles de actividad moderados en comparación con temporadas anteriores (Gráfico 5). Las visitas por enfermedades similares a la influenza continuaron elevadas y disminuyeron en comparación con las últimas semanas (Gráfico 6).

Graph 1. Costa Rica: Influenza virus distribution, EW 43, 2015-20
Distribución de virus influenza por SE 43, 2015-20




Graph 3. Costa Rica: Percent positivity for influenza, EW 43, 2020
(compared to 2011-19)


Porcentaje de positividad de influenza, SE 43 de 2020
(comparado con 2011-19)



Graph 2. Costa Rica: Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution, EW 43, 2015-20
Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2, SE 43, 2015-20




Graph 4. Costa Rica: RSV and other respiratory viruses distribution, EW 43, 2014-20
Distribución del VRS y otros virus respiratorios, SE 43, 2015-20




Graph 5. Costa Rica: Number of SARI cases, EW 43, 2020
(compared to 2013-19)

Número de casos de IRAG, SE 43 de 2020
(comparado con 2013-19)



Graph 6. Costa Rica: Number of ILI cases, EW 43, 2019-20
Número de casos de ETI, SE 43 de 2019-20




*To view more epi data, view [here](#). / Para ver más datos epi, vea [aquí](#).


Guatemala

- In Guatemala, during EW 43, no influenza or RSV detections were reported; influenza percent positivity remained at baseline levels with influenza B viruses circulating last week. Percent positive for SARS-CoV-2 decreased compared to previous weeks (Graphs 1, 2, and 3). Few detections of SARS-CoV-2 were recorded (12/485) (Graph 4). SARS-CoV-2 percent positive remained the same (14.0%) compared to the percent recorded in the previous week (14.0%). The departments with the highest cumulative number of cases were Guatemala, Escuintla, and Chimaltenango. / En Guatemala, en la SE 43, no se notificaron detecciones de influenza o VRS; el porcentaje de positividad para la influenza se mantuvo en los niveles iniciales con la circulación de los virus influenza B la semana pasada. El porcentaje de positivos para SARS-CoV-2 disminuyó en comparación con la semana anterior (Gráficos 1, 2 y 3). Se registraron pocas detecciones de SARS-CoV-2 (12/485) (Gráfico 4). El porcentaje de positividad SARS-CoV-2 (14,0%) permaneció igual en comparación con el porcentaje registrado en la semana anterior (14,0%). Los departamentos con mayor número acumulado de casos fueron Guatemala, Escuintla y Chimaltenango.


Graph 1. Guatemala: Influenza virus distribution, EW 43, 2015-20
Distribución de influenza, SE 43, 2015-20




Graph 3. Guatemala: Percentage positivity for influenza, EW 43, 2020 (compared to 2010-19)
Porcentaje de positividad de influenza, SE 43 de 2020 (comparado con 2010-19)



Graph 2. Guatemala: Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution, EW 43, 2015-20
Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2, SE 43, 2015-20



Graph 4. Guatemala: RSV and other respiratory viruses distribution, EW 43, 2015-20
Distribución del VRS y otros virus respiratorios, SE 43, 2015-20




*To view more epi data, view [here](#). / Para ver más datos epi, vea [aquí](#).

Honduras



- In EW 43, no influenza or RSV detections were reported with influenza B viruses circulating early in August. Influenza and RSV activity remained at baseline levels (Graphs 1, 2, and 3). In EW 43, at the national level, a total of 844 samples were analyzed for SARS-CoV-2, 12.1% tested positive, a decrease compared to the last week (16.7%). The number of SARI cases continued to decrease and was at low activity levels for this time of year compared to the average of previous seasons, below the epidemic curve (Graph 5). / En la SE 43, no se notificaron detecciones de influenza o VRS con la circulación de los virus influenza B a principios de agosto. La actividad de la influenza y el VRS se mantuvo en los niveles iniciales (Gráficos 1, 2 y 3). En la SE 43, a nivel nacional, se analizaron un total de 844 muestras para SARS-CoV-2, 12,1% dieron positivo, una disminución con respecto a la última semana (16,7%). El número de casos de IRAG continuó disminuyendo y se mantuvo en niveles bajos de actividad para esta época del año en comparación con el promedio de temporadas anteriores, por debajo de la curva epidémica (Gráfico 5).

Graph 1. Honduras: Influenza virus distribution,

EW 43, 2015-20


Distribución virus de la influenza,
SE 43, 2015-20**Graph 2.** Honduras: Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution,

EW 43, 2015-20


Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2,
SE 43, 2015-20**Graph 3.** Honduras: Percent positivity for influenza, EW 43, 2020
(compared to 2010-19)Porcentaje de positividad de influenza SE 43 de 2020
(comparado con 2010-19)**Graph 4.** Honduras: RSV and other respiratory virus distribution,

EW 43, 2015-20

Distribución del VRS y otros virus respiratorios, SE 43, 2015-20

**Graph 5.** Honduras: SARI cases, from sentinel surveillance, EW 43, 2020 (compared to 2010-19)


Casos de IRAG de la vigilancia centinela, SE 43 de 2020 (comparado con 2010-19)

*To view more epi data, view [here](#). / Para ver más datos epi, vea [aquí](#).


Nicaragua

- In EW 43, no influenza detections were reported with influenza A viruses circulating in the previous week; influenza percent positivity continued below the average epidemic curve. No respiratory syncytial virus (RSV) detections were recorded this week (Graphs 1, 2, and 3). SARS-CoV-2 detections continued to decrease, and percent positive decreased slightly compared to the percent recorded in previous weeks (Graph 4). In EW 43, 6.5% (81/1246) of the analyzed samples, tested positive for SARS-CoV-2. / En la SE 43, no se notificaron detecciones de influenza con la circulación de los virus influenza A en la semana pasada; el porcentaje de positividad de la influenza continuó por debajo de la curva epidémica promedio. No se registraron detecciones de virus respiratorio sincitial (VRS) esta semana (Gráficos 1, 2 y 3). Las detecciones de SARS-CoV-2 continuaron disminuyendo y el porcentaje de positividad disminuyó ligeramente comparado con el porcentaje registrado en semanas previas (Gráfico 4). En la SE 43, el 6,5% (81/1246) de las muestras analizadas dieron positivo para el SARS-CoV-2.


Graph 1. Nicaragua: Influenza virus distribution, EW 43, 2015-20
Distribución de influenza, SE 43, 2015-20




Graph 2. Nicaragua: Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution, EW 43, 2015-20
Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2, SE 43, 2015-20



Graph 3. Nicaragua: Percent positivity for influenza, from sentinel surveillance; EW 43, 2020 (compared to 2010-19)
Porcentaje de positividad de influenza de la vigilancia centinela; SE 43 de 2020 (comparado con 2010-19)



Graph 4. Nicaragua: RSV and other respiratory virus distribution, EW 43, 2015-20
Distribución del VRS y otros virus respiratorios, SE 43, 2015-20




*To view more epi data, view [here](#). / Para ver más datos epi, vea [aquí](#).

South America / América del Sur - Andean countries / Países andinos


Bolivia

- During EW 43, 2020, at the national level, no influenza detections were recorded with influenza A(H1N1)pdm09 viruses circulating in previous months; influenza percent positivity remained at baseline levels. No respiratory syncytial virus detections have been reported since January. SARS-CoV-2 percent positive remained the same compared to last weeks (Graphs 1, 2, and 3). SARS-CoV-2 detections decreased compared to the previous week, with 1082 samples positive (Graph 4). SARI cases remained at baseline levels (Graph 5). / En la SE 43 de 2020, a nivel nacional, no se registraron detecciones de influenza con la circulación de los virus influenza A(H1N1)pdm09 en meses anteriores; el porcentaje de positividad para la influenza se mantuvo en los niveles de referencia. No se han reportado detecciones de virus respiratorio sincitrial desde enero. El porcentaje de positividad para SARS-CoV-2 se mantuvo igual en comparación con las últimas semanas (Gráficos 1, 2 y 3). Las detecciones de SARS-CoV-2 disminuyeron en comparación con la semana anterior, con 1082 muestras positivas (Gráfico 4). Los casos de IRAG permanecen en los niveles de referencia (Gráfico 5).


Graph 1. Bolivia: Influenza virus distribution, EW 43, 2015-20
Distribución de influenza, SE 43, 2015-20




Graph 3. Bolivia: Percent positivity for influenza, EW 43, 2020 (compared to 2010-19)
Porcentaje de positividad de influenza, SE 43 de 2020 (comparado con 2010-19)




Graph 5. Bolivia: Number of SARI cases, EW 43, 2020 (compared to 2017-19)
Número de casos de IRAG, SE 43 de 2020 (comparado con 2017-19)



Graph 2. Bolivia: Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution, EW 43, 2015-20
Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2, SE 43, 2015-20



Graph 4. Bolivia: RSV and other respiratory viruses distribution, EW 43, 2015-20
Distribución del VRS y otros virus respiratorios, SE 43, 2015-20




*To view more epi data, view [here](#). / Para ver más datos epi, vea [aquí](#).


Colombia

- In Colombia, during the past months, influenza detections were almost nil with no detections in EW 43, with influenza B virus detections reported in June (Graph 1). No respiratory syncytial virus (RSV) detections were reported; RSV percent positive decreased at 0% (Graph 2). SARS-CoV-2 percent positive increased slightly and was at 13.0% this week (Graph 2). At the national level, of the 161 594 samples analyzed for SARS-CoV-2, 20 453 (12.7%) tested positive. Composite ARI cases x percent positivity for influenza remained at baseline levels (Graph 3). SARI case counts in the general ward has fluctuated in recent weeks to decrease slightly in EW43 and was below the seasonal threshold at low level of activity (Graph 4). The number of consultations for pneumonia and acute respiratory infections (ARI) continued below the average seasonal level (Graphs 5 and 6). / En Colombia, durante los últimos meses, las detecciones de influenza fueron casi nulas sin detecciones en la SE 43, con detecciones de virus influenza B reportadas en junio (Gráfico 1). No se informaron detecciones de virus respiratorio sincitial (VRS); el porcentaje de positividad para VRS disminuyó al 0% (Gráfico 2). El porcentaje de positivos para SARS-CoV-2 aumentó ligeramente y se ubicó en 13,0% esta semana (Gráfico 2). A nivel nacional, de las 161 594 muestras analizadas para SARS-CoV-2, 20 453 (12,7%) dieron positivo. Los casos compuestos de IRA x el porcentaje de positividad para la influenza se mantuvieron en los niveles iniciales (Gráfico 3). El recuento de casos de IRAG en la sala general ha fluctuado en las últimas semanas para disminuir ligeramente en la SE43 y estuvo por debajo del umbral estacional con bajo nivel de actividad (Gráfico 4). El número de consultas por neumonía e infecciones respiratorias agudas (IRA) continuó por debajo del nivel promedio estacional (Gráficos 5 y 6).


Graph 1. Colombia: Influenza virus distribution, EW 43, 2015-20
Distribución de virus influenza, SE 43, 2015-20




Graph 3. Colombia: Composite ARI cases x Percent positivity for influenza, EW 43, 2020 (compared to 2012-19)
Producto de casos de IRA x Porcentaje de positividad de influenza, SE 43 de 2020 (comparado con 2012-19)




Graph 5: Colombia: Pneumonia cases, EW 43, 2020 (compared to 2012-19)
Casos de neumonía, SE 43 de 2020 (comparado con 2012-19)




Graph 2. Colombia: Influenza, RSV and SARS-CoV-2 distribution, EW 43, 2015-20
Distribución de virus influenza, VRS y SAR-CoV-2, SE 43, 2015-20



Graph 4. Colombia: Number of SARI cases in general ward, EW 43, 2020 (compared to 2013-19)
Número de casos de IRAG en sala general, SE 43 de 2020 (comparado con 2013-19)



Graph 6. Colombia: Number of ARI cases (from all consultations) EW 43, 2020 (compared to 2012-19)
Número de casos de IRA, (de todas las consultas) SE 43 de 2020 (comparado con 2012-19)




*To view more epi data, view [here](#). / Para ver más datos epi, vea [aquí](#).

Ecuador

- Early in 2020, influenza detections were high, to decrease in the first months of the year. During the last seven months, no influenza or respiratory syncytial virus have been recorded. Influenza B, A(H1N1)pdm09, and A(H3N2) viruses were reported during the three first months of the year. SARS-CoV-2 percent positive increased slightly compared to the previous week and was at 18.0%, with an increase in the number of detections (Graphs 1, 2, 3, and 4). In EW 43, among 6334 samples processed for SARS-CoV-2, 18.8% of samples tested positive, an increase compared to 17.4% of samples tested positive in EW 42. The number of SARI cases increased above the epidemic levels at a moderate activity level compared to the average level of previous seasons. Pneumonia cases remained at baseline levels of activity for this time of year (Graphs 5 and 6). / A principios de 2020, las detecciones de influenza fueron altas, para disminuir en los primeros meses del año. Durante los últimos siete meses no se han registrado influenza ni virus sincitial respiratorio. Los virus influenza B, A(H1N1)pdm09 y A(H3N2) se notificaron durante los tres primeros meses del año. El porcentaje de positividad para SARS-CoV-2 aumentó ligeramente en comparación con la semana anterior y se ubicó en 18,0%, con un aumento en el número de detecciones (Gráficos 1, 2, 3 y 4). En la SE 43, de las 6334 muestras procesadas para SARS-CoV-2, el 18,8% de las muestras dieron positivo, un aumento en comparación con el 17,4% de las muestras dieron positivo en la SE 42. El número de casos de IRAG aumentó por encima de los niveles epidémicos en un moderado nivel de actividad en comparación con el nivel medio de temporadas anteriores. Los casos de neumonía se mantuvieron en niveles basales de actividad para esta época del año (Gráficos 5 y 6).


Graph 1. Ecuador: Influenza virus distribution from SARI sentinel cases, EW 43, 2015-20

Distribución de virus influenza de casos de IRAG centinela SE 43, 2015-20




Graph 3. Ecuador: Percent positivity for influenza, EW 43, 2020 (compared to 2011-19)

Porcentaje de positividad de influenza, SE 43 de 2020 (comparado con 2011-19)




Graph 5. Ecuador: Number of SARI cases / 100 inpatients, EW 43, 2020 (compared to 2015-2019)

Número de casos de IRAG / 100 hospitalizaciones, SE 43 de 2020 (comparado con 2015-19)




Graph 2. Ecuador: Influenza and RSV distribution from SARI sentinel cases, EW 43, 2015-20

Distribución de los virus influenza y VRS de casos de IRAG centinela, SE 43, 2015-20




Graph 4. Ecuador: RSV and other respiratory viruses distribution, EW 43, 2015-20

Distribución del VRS y otros virus respiratorios, SE 43, 2015-20



Graph 6. Ecuador: Pneumonia cases, EW 43, 2020 (compared to 2012-19)

Casos de neumonía, SE 43 de 2020 (comparado con 2012-19)




*To view more epi data, view [here](#). / Para ver más datos epi, vea [aquí](#).


Peru

- During EW 43, no influenza detections were reported with influenza A(H1N1)pdm09 viruses circulating early in the year (Graph 1). Influenza percent positivity remained at baseline levels of activity (Graphs 1 and 3). During 2020, no RSV detections have been reported. SARS-CoV-2 percent positive remained similar compared to the previous week (Graph 2). SARS-CoV-2 detections increased compared to previous weeks (Graph 4). At the national level, among 74 216 analyzed samples in EW 43, 6.3% were positive for SARS-CoV-2. / En la SE 43, no se notificaron detecciones de influenza con la circulación de los virus influenza A(H1N1)pdm09 a principios de año (Gráfico 1). El porcentaje de positividad para la influenza se mantuvo en los niveles iniciales de actividad (Gráficos 1 y 3). En el 2020, no se han notificado detecciones de VRS. El porcentaje de positividad para SARS-CoV-2 se mantuvo igual en comparación con la semana previa (Gráfico 2). Las detecciones de SARS-CoV-2 aumentaron en comparación con las semanas anteriores (Gráfico 4). A nivel nacional, de las 74 216 muestras analizadas en la SE 43, el 6,3% fueron positivas para SARS-CoV-2.


Graph 1. Peru: Influenza virus distribution, EW 43, 2015-20
Distribución de virus influenza, SE 43, 2015-20




Graph 3. Peru: Percent positivity for influenza, EW 43, 2020
(compared to 2010-19)
Porcentaje de positividad de influenza, SE 43 de 2020
(comparado con 2010-19)



Graph 2. Peru: Influenza and RSV distribution, EW 43, 2015-20
Distribución de virus influenza y VRS, SE 43, 2015-20



Graph 4. Peru: RSV and other respiratory viruses distribution,
EW 43, 2015-20
Distribución del VRS y otros virus respiratorios, SE 43, 2015-20




*To view more epi data, view [here](#). / Para ver más datos epi, vea [aquí](#).


Argentina

- During EW 42, no influenza detections were recorded with influenza B/Victoria, B/Yamagata, and influenza A(H3N2) viruses co-circulating in previous weeks. In recent weeks influenza activity increased and was below the epidemic threshold of previous seasons (Graphs 1 and 3). Few RSV detections were recorded in the previous month with adenovirus circulating this week. SARS-CoV-2 percent positive increased in EW 42 compared to the last week; detections increased compared to EW 41 (Graphs 2 and 4). Among 172 294 samples tested for SARS-CoV-2, 91 714 (53.2%) were positive. The three provinces with the highest cumulative percentage of samples testing positive for SARS-CoV-2 were Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, and Santa Fe. The number of ILI patients, have been low, continued to decrease and remained at baseline levels (Graph 5). / En la SE 42, no se registraron detecciones de influenza con la circulación concurrente de los virus influenza B/Victoria, B/Yamagata e influenza A(H3N2) en las semanas anteriores. En las últimas semanas la actividad de la influenza aumentó y estuvo por debajo del umbral epidémico de temporadas anteriores (Gráficos 1 y 3). Se registraron pocas detecciones de VRS en el mes anterior con la circulación de adenovirus esta semana. El porcentaje de positividad para SARS-CoV-2 aumentó en la SE 42 en comparación con la semana pasada; las detecciones aumentaron en comparación con la SE 41 (Gráficos 2 y 4). De 172 294 muestras analizadas para SARS-CoV-2, 91 714 (53,2%) fueron positivas. Las tres provincias con el porcentaje acumulado más alto de muestras que dieron positivo para SARS-CoV-2 fueron Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Santa Fe. El número de pacientes con ETI ha sido bajo, siguió disminuyendo y se mantuvo en los niveles basales (Gráfico 5).


Graph 1. Argentina: Influenza virus distribution, EW 42, 2015-20
Distribución de virus influenza, SE 42, 2015-20




Graph 3. Argentina: Percent positivity for influenza, EW 42, 2020
(compared to 2010-19)
Porcentaje de positividad de influenza, SE 42 de 2020
(comparado con 2010-19)




Graph 2. Argentina: Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution,
EW 42, 2015-20
Distribución de virus influenza, VRS y SARS-CoV-2, SE 42, 2015-20



Graph 4. Argentina: RSV and other respiratory virus distribution,
EW 42, 2015-20
Distribución del VRS y otros virus respiratorios, SE 42, 2015-20



Graph 5. Argentina: Number of ILI cases, EW 42, 2020,
(compared to 2012-19)
Número de casos ETI, SE 42 de 2020
(comparado con 2012-19)




Brazil

- During EW 43, no influenza detections were reported, with influenza B viruses circulating in past months. Influenza percent positivity remained at baseline levels of activity compared to previous seasons for the same period (Graphs 1, 2, and 3). In EW 43, no respiratory syncytial virus activity was recorded with no detections reported; SARS-CoV-2 percent positive decreased compared to the previous week and was at 11%. Few SARS-CoV-2 detections were reported (Graphs 2 and 4). / En la SE 43, no se reportaron detecciones de influenza, con la circulación de los virus influenza B en los meses anteriores. El porcentaje de positividad de influenza se mantuvo en los niveles iniciales de actividad en comparación con temporadas anteriores para el mismo período (Gráficos 1, 2 y 3). En la SE 43, no se registró actividad de virus respiratorio sincitrial y no se notificaron detecciones; el porcentaje de positividad para SARS-CoV-2 disminuyó comparado con la semana anterior y fue del 11%. Se notificaron pocas detecciones de SARS-CoV-2 (Gráficos 2 y 4).


Graph 1. Brazil: All NICs. Influenza virus distribution, EW 43, 2015-20

Distribución de virus influenza, SE 43, 2015-20




Graph 2. Brazil: All NICs. Influenza, RSV, and SARS-CoV-2, distribution, EW 43, 2015-20

Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2, SE 43, 2015-20




Graph 3. Brazil: Percent positivity for influenza, EW 43, 2020 (compared to 2011-19)

Porcentaje de positividad de influenza, SE 43 de 2020 (comparado con 2011-19)



Graph 4. Brazil: All NICs. RSV and other respiratory virus distribution, EW 43, 2015-20

Distribución del VRS y otros virus respiratorios SE 43, 2015-20




*To view more epi data, view [here](#). / Para ver más datos epi, vea [aquí](#)


Chile

- During EW 43, no influenza detections were reported with influenza A viruses circulating last month. Influenza activity continued below the average epidemic curve at baseline levels (Graphs 1 and 3). Few respiratory syncytial virus detections were reported, with adenovirus co-circulating. At sentinel sites, SARS-CoV-2 percent positivity decreased compared to the percentage recorded the last week; detections decreased (Graphs 2 and 4). The number of ILI visits increased slightly and continued below the epidemic curve at baseline levels of activity (Graph 5). The number of SARI cases decreased and was below the epidemic threshold for this time of year as compared to previous seasons (Graph 6). / En la SE 43, no se notificaron detecciones de influenza con la circulación de los virus influenza A el mes pasado. La actividad de la influenza continuó por debajo de la curva epidémica promedio en los niveles de referencia (Gráficos 1 y 3). Se notificaron algunas detecciones del virus respiratorio sincitrial con la circulación concurrente de adenovirus. En los sitios sentinelas, el porcentaje de positividad del SARS-CoV-2 disminuyó comparado con el porcentaje registrado la semana pasada; las detecciones disminuyeron (Gráficos 2 y 4). El número de visitas por ETI aumentaron ligeramente y continuó por debajo de la curva epidémica en los niveles de actividad inicial (Gráfico 5). El número de casos de IRAG disminuyó y estuvo por debajo del umbral epidémico para esta época del año en comparación con temporadas anteriores (Gráfico 6).


Graph 1. Chile: Influenza virus distribution, EW 43, 2015-20
Distribución de virus de influenza, SE 43, 2015-20




Graph 3. Chile: Percent positivity for influenza, EW 43, 2020
(compared to 2010-19)
Porcentaje de positividad de influenza, SE 43 de 2020
(comparado con 2010-19)




Graph 5. Chile: Number of ILI cases EW 43, 2020
(compared to 2015-19)
Número de consultas por ETI, SE 43 de 2020
(comparado con 2015-19)




Graph 2. Chile: Influenza, RSV, and SARS-CoV-2, distribution,
(sentinel surveillance) EW 43, 2015-20
Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2,
(vigilancia centinela) SE 43, 2015-20



Graph 4. Chile: RSV and other respiratory viruses distribution,
(sentinel surveillance) EW 43, 2015-20
Distribución del VRS y otros virus respiratorios
(vigilancia centinela) SE 43, 2015-20



Graph 6. Chile: Number of SARI cases, EW 43, 2020
(compared to 2015-19)
Número de casos de IRAG, SE 43 de 2020
(comparado con 2015-19)




*To view more epi data, view [here](#). / Para ver más datos epi, vea [aquí](#).


Paraguay

- Influenza detections were last reported in mid-April with influenza B viruses circulating; during EW 43, at the national level, no influenza detections were reported, and influenza activity continued below the seasonal threshold (Graphs 1 and 3). Since EW 24, no RSV detections have been reported. SARS-CoV-2 percent positive increased at 27.0%, compared to 25.0% the previous week; detections decreased compared to the last week (Graphs 2, and 4). During EW 41, the number of SARI cases remained the same compared to the previous week. SARI activity continued at extraordinary levels and was associated with SARS-CoV-2 detections (Graph 5). ILI cases/1000 outpatients have decreased in recent weeks, below the seasonal threshold compared to the average level in previous seasons (Graph 6). / Las detecciones de influenza se informaron por última vez a mediados de abril con la circulación de los virus influenza B; en la SE 43, a nivel nacional, no se reportaron detecciones de influenza y la actividad de influenza continuó por debajo del umbral estacional (Gráficos 1 y 3). Desde la SE 24, no se han reportado detecciones de VRS. El porcentaje de positivos para SARS-CoV-2 aumentó en un 27,0%, en comparación con el 25,0% de la semana anterior; las detecciones disminuyeron en comparación con la semana pasada (Gráficos 2 y 4). Durante la SE 41, el número de casos de IRAG se mantuvo igual en comparación con la semana anterior. La actividad de IRAG continuó en niveles extraordinarios y se asoció con detecciones de SARS-CoV-2 (Gráfico 5). Los casos de ETI / 1000 pacientes ambulatorios han disminuido en las últimas semanas, por debajo del umbral estacional en comparación con el nivel promedio de temporadas anteriores (Gráfico 6).


Graph 1. Paraguay: Influenza virus distribution EW 43, 2015-20
Distribución de virus de influenza, SE 43, 2015-20




Graph 3. Paraguay: Percent positivity for influenza, EW 43, 2020
(in comparison to 2011-19)
Porcentaje de positividad de influenza, SE 43 de 2020
(comparado con 2011-19)




Graph 5. Paraguay: Number of SARI cases EW 41, 2020
(compared to 2015-19)
Número de casos de IRAG, SE 41 de 2020 (comparado con 2015-19)




Graph 2. Paraguay: Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution,
EW 43, 2015-20
Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2, SE 43, 2015-20



Graph 4. Paraguay: RSV and other respiratory viruses distribution,
(sentinel surveillance) EW 41, 2015-20
Distribución del VRS y otros virus respiratorios
(vigilancia centinela) SE 41, 2015-20



Graph 6. Paraguay: ILI cases/1000 outpatients, EW 41, 2020
(compared to 2015-19)
Casos de ETI por cada 1000 consultas ambulatorias, SE 41 de 2020
(comprado con 2015-19)




*To view more epi data, view [here](#). / Para ver más datos epi, vea [aquí](#).


Uruguay

- In Uruguay, circulation of influenza A(H1N1)pdm09 was reported in EW 39. During EW 43, no influenza detections or respiratory syncytial virus were reported. Influenza percent positivity remained at baseline levels. Few SARS-CoV-2 detections were reported. SARS-CoV-2 percent positive increased compared to previous weeks (Graphs 1, 2, and 3). The number of SARI cases / 100 hospitalizations decreased and remained below the seasonal threshold (Graph 4). / En Uruguay, se notificó la circulación de influenza A(H1N1)pdm09 en la SE 39. En la SE 43 no se notificaron detecciones de influenza ni virus respiratorio sincitrial. El porcentaje de positividad para la influenza se mantuvo en los niveles iniciales. Se notificaron pocas detecciones de SARS-CoV-2. El porcentaje de positividad para SARS-CoV-2 aumentó comparado con semanas anteriores (Gráficos 1, 2 y 3). El número de casos de IRAG / 100 hospitalizaciones disminuyó y permaneció por debajo del umbral estacional (Gráfico 4).


Graph 1. Uruguay: Influenza virus distribution EW 43, 2015-20
Distribución de virus de influenza, SE 43, 2015-20




Graph 3. Uruguay: Percent positivity for influenza, EW 43, 2020
(compared to 2010-19)
Porcentaje de positividad de influenza, SE 43 de 2020
(comparado con 2010-19)



Graph 2. Uruguay: Influenza and RSV distribution, EW 43, 2015-20
Distribución de los virus influenza y VRS, SE 43, 2015-20



Graph 4. Uruguay: SARI cases/100 hospitalizations,
EW 43, 2020 (compared to 2017-19)
Casos de IRAG/100 hospitalizaciones,
SE 43 de 2020 (comparado con 2017-19)



*To view more epi data, view [here](#). / Para ver más datos epi, vea [aquí](#).

ACRONYMS

ARI	Acute respiratory infection
CARPHA	Caribbean Public Health Agency
CENETROP	Centro de Enfermedades Tropicales (Santa Cruz, Bolivia)
EW	Epidemiological week
ILI	Influenza-like illness
INS	Instituto Nacional de Salud
ORV	Other respiratory viruses
SARI	Severe acute respiratory infection
ICU	Intensive care unit
RSV	Respiratory syncytial virus

ACRÓNIMOS

CARPHA	Agencia de Salud Pública del Caribe
CENETROP	Centro de Enfermedades Tropicales (Santa Cruz, Bolivia)
ETI	Enfermedad tipo influenza
INLASA	Instituto Nacional de Laboratorios de Salud (La Paz, Bolivia)
INS	Instituto Nacional de Salud
IRA	Infección respiratoria aguda
IRAG	Infección respiratoria agudagrave
OVR	Otros virus respiratorios
SE	Semana epidemiológica
SEDES	Servicio Departamental de Salud (Bolivia)
UCI	Unidad de cuidados intensivos
VRS	Virus respiratorio sincitial