

# VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO



## El dato

El cáncer cervicouterino es **UNA DE LAS CAUSAS PRINCIPALES DE MUERTE EN LAS MUJERES**, y más del 95% es causado por el virus del papiloma humano (VPH).



## La enfermedad

- > El VPH es una de las infecciones más comunes del **TRACTO REPRODUCTIVO**. Provoca una variedad de enfermedades tanto en **HOMBRES COMO EN MUJERES** como el cáncer cervicouterino, cáncer de pene y del ano, de boca y de orofaringe (garganta) y verrugas anogenitales.
- > La vacunación contra el VPH, las pruebas de tamizaje y tratamiento de lesiones precancerosas son **IMPRESCINDIBLES** para prevenir el cáncer cervicouterino.



## Transmisión

Usualmente, la transmisión ocurre durante la **RELACIÓN O CONTACTO SEXUALES** de piel con piel con la persona que tiene el virus. Puede ser transmitido aún con el uso de condones y en relaciones monógamas.

Puede también ser transmitido:

- > por medio de objetos o materiales infectados.
- > por contacto directo con heridas y abrasiones
- > en raros casos, de madre para hijo durante el parto.



## Vacunas

- > La vacuna contra el VPH es muy eficaz para la **PREVENCIÓN** del 70% de los cánceres cervicouterinos, así como casos de cáncer de pene y del ano, de boca y de orofaringe (garganta).
- > Las altas coberturas en niñas (>90%) **REDUCEN EL RIESGO** de infección en los niños.
- > 44 países y territorios de la Región vacunan contra el VPH.



## Calendario

2 dosis de vacuna, con intervalo de seis meses:

- > Niñas de 9-14 años, antes de que empiecen su actividad sexual.
- > Algunos países incluyen niños.
- > 44 países y territorios de la Región vacunan contra el VPH.

Además, si se extiende la vacunación a otros grupos se pueden administrar:

- > Una o dos dosis para adolescentes y mujeres de 15-20 años
- > Dos dosis, con seis meses de intervalo, para mujeres de 21 años o más.

Nuevos estudios han demostrado que una dosis puede ofrecer protección comparable.