

RECOMENDACIONES DEL GTA PARA EL HEAMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B (HIB)

Preparado por Ruthly François

Organización Panamericana de la Salud (OPS), 2015

Índice

| | |
|----------------------------|---|
| 1999 Recomendaciones | 2 |
| Vacunas combinadas | 2 |
| 2000 Recomendaciones | 3 |
| 2004 Recomendaciones | 4 |

1999 Recomendaciones

- Se debe incluir la vacuna contra Hib en los programas de vacunación regular de la Región una vez garantizada su sostenibilidad.
- Países que estén introduciendo la vacuna de Hib deben monitorear e informar las coberturas de vacunación.
- La compra de vacuna contra Hib o de vacunas combinadas que incluyan la vacuna contra Hib debe hacerse por medio del Fondo Rotatorio de la OPS para la Compra de Vacunas a fin de obtener precios más bajos con las compras de mayor volumen.
- Los países deben contar con un sistema de vigilancia de las enfermedades causadas por Hib y determinar el impacto del uso de la vacuna. Todos los países en la Región deben implementar un sistema centinela basado en hospitales para la vigilancia de meningitis y neumonías causadas por Hib y Streptococcus pneumoniae. La vigilancia debe ser fortalecida e integrada con los sistemas ya existentes. Se debe organizar en cada país una red formada por hospitales centinelas, laboratorios de salud pública y unidades nacionales de epidemiología.
- La OPS debe proveer el apoyo técnico para asegurar la implementación y coordinación de este sistema de vigilancia.

Vacunas combinadas

La disponibilidad de vacunas combinadas basadas en la vacuna de DTP simplificará la administración de un número creciente de antígenos en los esquemas regulares de inmunización infantil. Se disminuirá el número de inyecciones, las visitas a los proveedores de servicios de salud, y por lo tanto la aprehensión de niños y padres a la vacunación, aumentando el cumplimiento y las coberturas vacunales.

- Los países que incluyen en sus programas regulares de inmunización vacunas DTP, Hib y Hepatitis B deben considerar introducir vacunas que estén compuestas de cuatro o cinco antígenos combinados.

2000 Recomendaciones

1. Países que no están usando la vacuna de Hib deben hacer un esfuerzo para introducirla en sus programas de inmunización de rutina.
2. Países que ya están usando la vacuna Hib deben monitorear y reportar la cobertura de vacuna y casos de Hib para medir el impacto de la vacunación.
3. El GTA recomienda establecer mecanismos financieros sostenibles para mantener la vacunación contra Hib. La compra de esta vacuna como antígeno solo o en combinación con DTP o DTP/HepB (reduciendo así el número de visitas y aumentando el cumplimiento), a través del Fondo Rotatorio de OPS puede resultar en un ahorro significativo en los costos.
4. La disponibilidad y uso de vacunas combinadas con DPT simplificará la administración de antígenos contra las principales enfermedades de la niñez.

2004 Recomendaciones

- Los países que todavía no están usando la vacuna contra el Hib deben hacer todo lo posible por introducirla en sus programas rutinarios de vacunación.
- Los países que ya están usando la vacuna contra el Hib deben monitorear y notificar la cobertura de vacunación y los casos de Hib para evaluar el impacto de la intervención.
- El GTA recomienda establecer mecanismos financieros sostenibles para mantener la vacunación contra el Hib. La adquisición de esta vacuna combinada con DTP o DTP/HepB a través del Fondo Rotatorio de la OPS puede resultar en ahorros considerables mejorando así la sostenibilidad.