

Enfermedades infecciosas emergentes y reemergentes, Región de las Américas

Vol. 4, No. 2 (8 febrero 2007)

Brote de dengue en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Resumen de la situación actual en Bolivia

Actualmente se está reportando un incremento en la transmisión de dengue concentrándose la mayor cantidad de casos en Santa Cruz de la Sierra.


Hasta el 7 de febrero del 2007 (Semana Epidemiológica No. 6) se han notificado:

- 459 casos sospechosos de fiebre por dengue
- 118 casos confirmados de fiebre por dengue clásico
- 4 casos de fiebre por dengue hemorrágico
- 1 muerte
- Tasa de letalidad: 25 %
- Departamentos afectados: Santa Cruz de la Sierra y pequeñas ciudades aledañas



En Bolivia, Santa Cruz de la Sierra es un área endémica de dengue con un comportamiento casi estacional y sus periodos de mayor incidencia y reporte de casos históricamente son entre los meses de noviembre y mayo como se muestra en el siguiente gráfico del [Boletín Semanal de Vigilancia, No. 2, enero 2007](#), del Sistema Nacional de Información en Salud (SNIS) del Ministerio de Salud y Deportes. Actualmente se está reportando un incremento en la transmisión de dengue concentrándose la mayor cantidad de casos en Santa Cruz de la Sierra.

Casos sospechosos de Dengue por semana epidemiológica. Bolivia, 2006



Fuente: Ministerio de Salud y Deportes de Bolivia, Sistema Nacional de Información de Salud (SNIS), Boletín Epidemiológico Semanal, No. 2, enero 2007, Semana Epidemiológica No. 2, pág. 1.

Acciones de prevención y control en ejecución

- Se creó una comisión extrasectorial incluyendo la oficina de OPS/OMS.
- El Dr. José Carlos Arraya, Jefe del Programa Nacional de dengue informó que se están realizando acciones intensivas de eliminación de criaderos del mosquito y se está recibiendo el apoyo de las Fuerzas Armadas (Policía).
- Hay dos campañas masivas programadas para los días 9 y 10 de febrero en Santa Cruz de la Sierra, donde se concentrarán las acciones en la eliminación masiva de criaderos del vector y reordenamiento ambiental por parte de la población.
- Las acciones de control de tratamiento de criaderos con Abate® (Temephos al 1%) y eliminación de adultos (fumigación) se realizan por cuatro brigadas apoyadas por supervisores del nivel central.

Acciones a nivel clínico: Simultáneamente se hizo una capacitación para actualizar al personal de salud, para el manejo clínico de casos de dengue, incluyendo a más de 200 médicos y personal de apoyo; esta actividad ha sido muy reforzada en los últimos años con capacitaciones por asesores de OPS/OMS.

Elaboración de la Estrategia de Gestión Integrada para la prevención y control del dengue en Bolivia

En estos momentos se está programando el reforzamiento del Plan Nacional de Dengue con la elaboración de la *Estrategia de Gestión Integrada para la prevención y control del dengue* ([EGI-Dengue](#)) a finales del primer semestre de este año, con lo que quedará un sólido documento técnico que:

1. servirá de guía única para el desarrollo de las acciones preventivas y de control y que
2. reforzará las capacidades del sector salud para lograr nuevas asociaciones extrasectoriales e impulsen metodologías para cambios conductuales en el control de los criaderos más importantes del vector y

3. hagan más sostenibles las acciones de lucha contra el dengue.

En la semana del 19 al 24 de marzo se llevará a cabo un taller de reforzamiento en *Comunicación para Impactar en Conducta* (COMBI) por la Dra. Linda Lloyd en calidad de Asesora Temporera de OPS/OMS y experta en el área de Comunicación Social.

Fuente: Información obtenida por el [Programa Regional de Dengue](#) de la OPS, a través de la Representación de la OPS en La Paz, Bolivia ([OPS-Bolivia](#)), obtenida del [Boletín Semanal de Vigilancia, No. 2, enero 2007](#), del Sistema Nacional de Información en Salud ([SNIS](#)) del Ministerio de Salud y Deportes de Bolivia.