


SURINAME

INDICADORES SOCIODEMOGRÁFICOS¹



- **Población total:** 529.400
- **Media anual de defunciones:** 3.800
- **Esperanza de vida al nacer (años):**
Total: 71 Hombres: 68 Mujeres: 74
- **Población adulta alfabetizada:** 94,6%
- **Ingreso nacional bruto US\$ per cápita:** 4.760


FACTORES DE RIESGO

Prevalencia de:	Total (%)	Hombres (%)	Mujeres (%)
Adultos fumadores actuales de tabaco ^{2,a}	...	38.4	9.9
Jóvenes consumidores actuales de cualquier producto de tabaco ³	19.2	20.7	16.6
Consumo de frutas y verduras en adultos ^{1,b}
Consumidores de alcohol en los últimos 12 meses ⁴
Actividad física baja en adultos ^{1,c}
Obesidad en adultos (IMC ≥ 30) ¹	25.8	16.5	34.6
Prevalencia de VPH (mujeres con citología normal) ⁵


Notas: a: adultos de 12 a 65 años; b: % que consume 5 o más porciones de frutas y verduras al día; c: % físicamente activo <600 met por minuto; IMC: Índice de masa corporal; VPH: Virus del Papiloma Humano.

PERFIL DE MORTALIDAD POR CÁNCER (2009)⁶


HOMBRES



MUJERES



TENDENCIAS DE LAS TASAS ESTANDARIZADAS DE MORTALIDAD POR CÁNCER (2000-2009)⁶



Porcentaje medio de cambio anual (PMCA) de las tasas estandarizadas de mortalidad, según tipo de cáncer (2000-2009) ⁶				
Tipo de cáncer	Sexo	Número de muertes (2009)	TEM (2009)	PMCA
Todos los cánceres	Hombres	182	96,69	1,89
	Mujeres	159	68,99	0,48
Cáncer de mama		28	12,53	-
Cáncer cervicouterino		21	8,99	-
Cáncer colorrectal	Hombres	31	17,16	-
	Mujeres	17	7,40	-
Cáncer de hígado	Hombres	14	7,03	-
	Mujeres	9	3,89	-
Cáncer de pulmón	Hombres	31	16,26	-
	Mujeres	13	5,77	-
Cáncer de próstata		30	17,56	-
Cáncer de estómago	Hombres	7	3,97	-
	Mujeres	4	1,69	-

Notas: TEM: Tasa estandarizada de mortalidad; PMCA: Porcentaje medio de cambio anual; *: El PMCA es estadísticamente significativo distinto de cero para $p=0.05$.

PLANES DE CÁNCER Y REGISTROS DE CÁNCER⁷

National integrated NCD policy, strategy or action plan	
¿Hay una política, estrategia o plan de acción integrado para las ENT?	Si
¿Está incluido el cáncer en el plan de ENT?	Si
Primer año de implementación	2012
Política, estrategia o plan de acción para el cáncer	
¿Hay una política, estrategia o plan de acción para el cáncer?	No en efecto
Primer año de implementación	N/A
Registro de cáncer	
¿Hay un registro de cáncer?	Si
¿Alcance (Nacional vs. Subnacional)?	Nacional
¿Tipo de registro (Poblacional vs. hospitalario)?	Otros
Último año con información disponible	2012

POLÍTICAS PARA LA PREVENCIÓN PRIMARIA DEL CÁNCER

Control del tabaco²	
¿Espacios libres de humo?	Todos los espacios públicos son totalmente libres de humo
¿Impuestos sobre el tabaco?	Los impuestos representan el 61% del precio final
¿Advertencias sanitarias sobre los peligros del tabaco?	Advertencia grande con todas las características apropiadas (pendiente de reglamentación y/o implementación)
¿Prohibición de la publicidad, promoción y patrocinio del tabaco?	Prohibición de todas las formas de publicidad directa e indirecta
Prevención y control del sobrepeso y la obesidad⁷	
¿Hay una política, estrategia o plan de acción para la reducción del sobrepeso y la obesidad? (Primer año de implementación)	No
Prevención y control del consumo abusivo de alcohol⁷	
¿Hay una política, estrategia o plan de acción para la reducción del consumo abusivo de alcohol? (Primer año de implementación)	No
¿Está incluida la vacuna frente al VPH en el programa nacional de inmunizaciones?⁸	Si
Año de introducción/Población diana/Estrategia de administración	2013/.../...
Cobertura estimada de 3 dosis (año de calendario)	...
¿Está incluida la vacuna frente al VHB en el programa nacional de inmunizaciones?⁸	Si
Año de introducción/Población diana	2003/Recién nacidos-2m-4m-6m; grupos de riesgo
Cobertura estimada de 3 dosis (2012)	84%

TAMIZAJE DEL CÁNCER

Cáncer cervicouterino	
Guías de práctica clínica⁹	
¿Se dispone de guías para el tamizaje del cáncer cervicouterino?	Si
Recomendaciones de la guía (Prueba/Grupo de edad/Frecuencia)	Pap/mujeres postmenopáusicas/cada 2 años IVAA/23-55 años/ cada 2 años
Disponibilidad y cobertura de los servicios de tamizaje	
Citología cervical⁷	Generalmente disponible en los sectores público y privado
Inspección visual con ácido acético⁷	Generalmente disponible en los sectores público y privado
Cobertura de tamizaje⁹	<15% de la población diana

TAMIZAJE DEL CÁNCER

Cáncer de mama	
Guías de práctica clínica	
¿Se dispone de guías para el tamizaje del cáncer de mama?	...
Recomendaciones de la guía (Prueba/Grupo de edad/Frecuencia)	...
Disponibilidad y cobertura de los servicios de tamizaje	
Examen clínico de las mamas⁷	Generalmente disponible en los sectores público y privado
Mamografía⁷	Generalmente disponible en los sectores público y privado
Cobertura de tamizaje	...
Cáncer colorrectal	
Guías de práctica clínica	
¿Se dispone de guías para el tamizaje del cáncer colorrectal?	...
Recomendaciones de la guía (Prueba/Grupo de edad/Frecuencia)	...
Disponibilidad y cobertura de los servicios de tamizaje	
Prueba de sangre oculta en heces o prueba inmunológica con material fecal⁷	Generalmente disponible en los sectores público y privado
Exploración o colonoscopia⁷	Generalmente disponible en los sectores público y privado
Cobertura de tamizaje	...

TRATAMIENTO DEL CÁNCER Y CUIDADOS PALIATIVOS

Radioterapia ¹⁰		Morfina oral ⁷	
¿Servicio disponible en el sector público? ⁷	Generalmente disponible	¿Disponibilidad en el sector público?	Generalmente disponible
Unidades de telerradioterapia/millón de habitantes	1,9	¿Cubierto por seguro de salud o financiado públicamente?	Si
Centros de radioterapia	1	¿Aparece en la lista de medicamentos esenciales?	Si
Oncólogos radioterapeutas	...	Consumo de opioides ¹¹	
Médicos físicos	...	Total de equivalentes de morfina, per cápita	...
Quimioterapia ⁷		¿Disponibilidad cuidados comunitarios/domiciliarios? ⁷	
¿Servicio disponible en el sector público?	Generalmente disponible	¿Hay servicios comunitarios/domiciliarios disponibles en el sector público para personas con ENT en etapas avanzadas?	Generalmente disponible

Notas: ... Información no disponible; N/A: No aplicable; m: meses; IVAA: Inspección visual con ácido acético.

Fuentes:

- (1) OPS. Enfermedades no transmisibles en las Américas: Indicadores básicos 2011. Washington D.C, EUA, 2011.
- (2) WHO Report on the Global Tobacco Epidemic, 2013, consultado el 28 de Agosto del 2013, en <http://www.who.int/tobacco>
- (3) PAHO/WHO. Tobacco Control Report for the Region of the Americas, 2013. Washington D.C, USA, 2013.
- (4) WHO. Global Information System on Alcohol and Health, consultado el 28 de Agosto del 2013, en <http://bit.ly/17zhuqZ>.
- (5) ICO. Information Centre on HPV and Cancer, consultado el 28 de Agosto del 2013, en <http://www.hpvcentre.net/>.
- (6) OPS. Sistema de Información de mortalidad, 2012.
- (7) OPS. Encuesta Nacional Sobre la Capacidad de los países para la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles, 2013.
- (8) OPS Unidad de inmunización integral de la familia. Perfiles de país de inmunizaciones, consultado el 28 de Agosto del 2013, en <http://bit.ly/1dn4Td3>; OPS Cobertura de inmunizaciones reportada en las Américas, por tipo de vacuna consultado el 28 de Agosto del 2013, en <http://bit.ly/1dn59ZK>.
- (9) PAHO. Survey of Caribbean Cervical Cancer Program Managers, 2013. Sin publicar.
- (10) OMS/IAEA Base de datos del directorio de centros de radioterapias (DIRAC), consultado el 28 de Agosto del 2013, en <http://www.naweb.iaea.org/nahu/dirac/>.
- (11) Universidad de Wisconsin. Centro colaborador de la OMS para las políticas sobre el dolor y los cuidados paliativos, Base de datos sobre consumo de opioides 2010, consultado el 28 de Agosto del 2013, en <http://www.painpolicy.wisc.edu/countryprofiles/amro>.