


URUGUAY

INDICADORES SOCIODEMOGRÁFICOS¹



- **Población total:** 3.380.000
- **Media anual de defunciones:** 31.300
- **Esperanza de vida al nacer (años):**
Total: 77 Hombres: 74 Mujeres: 81
- **Población adulta alfabetizada:** 98,3%
- **Ingreso nacional bruto US\$ per cápita:** 9.010


FACTORES DE RIESGO

Prevalencia de:	Total (%)	Hombres (%)	Mujeres (%)
Adultos fumadores actuales de tabaco ^{2,a}	25,0	29,0	21,0
Jóvenes consumidores actuales de cualquier producto de tabaco ²	23,2	21,4	24,5
Consumo de frutas y verduras en adultos ^{1,b}	15,1	14,9	15,1
Consumidores de alcohol en los últimos 12 meses ³	47,0	59,2	36,3
Actividad física baja en adultos ^{1,c}	35,1	29,0	40,7
Obesidad en adultos (IMC ≥ 30) ¹	19,9	19,4	20,5
Prevalencia de VPH (mujeres con citología normal) ⁴


Notas: a: prevalencia estandarizada por edad de consumo de tabaco en adultos (15 años o más), 2011; b: % que consume 5 o más porciones de frutas y verduras al día; c: % físicamente activo <600 met por minuto; IMC: Índice de masa corporal; VPH: Virus del Papiloma Humano.

PERFIL DE MORTALIDAD POR CÁNCER (2009)⁵

HOMBRES



MUJERES



*Nota: La OPS sólo dispone de datos de mortalidad para Uruguay para los años 2000-2001, 2003-2004 y 2009, por lo que no fue posible realizar un análisis de tendencias.

PLANES DE CÁNCER Y REGISTROS DE CÁNCER⁶

National integrated NCD policy, strategy or action plan	
¿Hay una política, estrategia o plan de acción integrado para las ENT?	Si
¿Está incluido el cáncer en el plan de ENT?	Si
Primer año de implementación	2005
Política, estrategia o plan de acción para el cáncer	
¿Hay una política, estrategia o plan de acción para el cáncer?	Si
Primer año de implementación	2006
Registro de cáncer	
¿Hay un registro de cáncer?	Si
¿Alcance (Nacional vs. Subnacional)?	Nacional
¿Tipo de registro (Poblacional vs. hospitalario)?	Poblacional
Último año con información disponible	2008

POLÍTICAS PARA LA PREVENCIÓN PRIMARIA DEL CÁNCER

Control del tabaco²	
¿Espacios libres de humo?	Todos los espacios públicos son totalmente libres de humo
¿Impuestos sobre el tabaco?	Los impuestos representan el 69% del precio final
¿Advertencias sanitarias sobre los peligros del tabaco?	Advertencia grande con todas las características apropiadas
¿Prohibición de la publicidad, promoción y patrocinio del tabaco?	Prohibición en televisión nacional, radio y medios impresos, y de algunas pero no todas las formas de publicidad directa y/o indirecta
Prevención y control del sobrepeso y la obesidad⁶	
¿Hay una política, estrategia o plan de acción para la reducción del sobrepeso y la obesidad? (Primer año de implementación)	No
Prevención y control del consumo abusivo de alcohol⁶	
¿Hay una política, estrategia o plan de acción para la reducción del consumo abusivo de alcohol? (Primer año de implementación)	No
¿Está incluida la vacuna frente al VPH en el programa nacional de inmunizaciones?⁷	
Año de introducción/Población diana/Estrategia de administración	2013/niñas de 12 años/establecimientos de salud
Cobertura estimada de 3 dosis (año de calendario)	...
¿Está incluida la vacuna frente al VHB en el programa nacional de inmunizaciones?⁷	
Año de introducción/Población diana	1999/2m-4m-6m-15m; 12 años (3 dosis, 0-1m-6m); personal sanitario
Cobertura estimada de 3 dosis (2012)	95%

TAMIZAJE DEL CÁNCER

Cáncer cervicouterino	
Guías de práctica clínica⁸	
¿Se dispone de guías para el tamizaje del cáncer cervicouterino?	Si
Recomendaciones de la guía (Prueba/Grupo de edad/Frecuencia)	Pap/30-64 años/Cada 3 años
Disponibilidad y cobertura de los servicios de tamizaje	
Citología cervical⁶	
Inspección visual con ácido acético ⁶	Generalmente no disponible en el sector público y generalmente disponible en el sector privado
Cobertura de tamizaje⁹	
	55,2% de las mujeres de 18-69 (2003)

TAMIZAJE DEL CÁNCER

Cáncer de mama	
Guías de práctica clínica ¹⁰	
¿Se dispone de guías para el tamizaje del cáncer de mama?	Si
Recomendaciones de la guía (Prueba/Grupo de edad/Frecuencia)	ECM/mujeres de 20-39 años, cada 3 años; mujeres de 40 años o más, anual Mamografía/mujeres de 40 años o más/cada 1-2 años
Disponibilidad y cobertura de los servicios de tamizaje	
Examen clínico de las mamas ⁶	Generalmente disponible en los sectores público y privado
Mamografía ⁶	Generalmente disponible en los sectores público y privado
Cobertura de tamizaje	...
Cáncer colorrectal	
Guías de práctica clínica ¹¹	
¿Se dispone de guías para el tamizaje del cáncer colorrectal?	Si
Recomendaciones de la guía (Prueba/Grupo de edad/Frecuencia)	...
Disponibilidad y cobertura de los servicios de tamizaje	
Prueba de sangre oculta en heces o prueba inmunológica con material fecal ⁶	Generalmente disponible en los sectores público y privado
Exploración o colonoscopia ⁶	Generalmente disponible en los sectores público y privado
Cobertura de tamizaje	...

TRATAMIENTO DEL CÁNCER Y CUIDADOS PALIATIVOS

Radioterapia ¹²		Morfina oral ⁶	
¿Servicio disponible en el sector público? ⁶	Generalmente disponible	¿Disponibilidad en el sector público?	Generalmente disponible
Unidades de telerradioterapia/millón de habitantes	5,3	¿Cubierto por seguro de salud o financiado públicamente?	Si
Centros de radioterapia	10	¿Aparece en la lista de medicamentos esenciales?	Si
Oncólogos radioterapeutas	45	Consumo de opioides ¹³	
Médicos físicos	10	Total de equivalentes de morfina, per cápita	5,86
Quimioterapia ⁶		¿Disponibilidad cuidados comunitarios/domiciliarios? ⁶	
¿Servicio disponible en el sector público?	Generalmente disponible	¿Hay servicios comunitarios/domiciliarios disponibles en el sector público para personas con ENT en etapas avanzadas?	Generalmente disponible

Notas: ... Información no disponible; N/A: No aplicable; m: meses; ECM: Examen clínico de las mamas.

Fuentes:

- (1) OPS. Enfermedades no transmisibles en las Américas: Indicadores básicos 2011. Washington D.C, EUA, 2011.
- (2) PAHO/WHO. Tobacco Control Report for the Region of the Americas, 2013. Washington D.C, USA, 2013.
- (3) WHO. Global Information System on Alcohol and Health, consultado el 28 de Agosto del 2013, en <http://bit.ly/17zhuqZ>.
- (4) ICO. Information Centre on HPV and Cancer, consultado el 28 de Agosto del 2013, en <http://www.hpvcentre.net/>.
- (5) OPS. Sistema de Información de mortalidad, 2012.
- (6) OPS. Encuesta Nacional Sobre la Capacidad de los países para la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles, 2013.
- (7) OPS. Perfiles de país de inmunizaciones, consultado el 28 de Agosto del 2013, en <http://bit.ly/1dn4Td3>; OPS. Cobertura de inmunizaciones reportada en las Américas, por tipo de vacuna consultado el 28 de Agosto del 2013, en <http://bit.ly/1dn59ZK>.
- (8) Programa de prevención de cáncer de cuello uterino en el Uruguay "Dr. Enrique Pouey". 2007. consultado el 28 de Agosto del 2013, en: <http://bit.ly/1dx67m4>.
- (9) ICO Information Centre on Human Papilloma Virus (HPV) and Cancer, 2013. consultado el 28 de Agosto del 2013, en <http://bit.ly/16ADEYL>.
- (10) González-Robledo LM. Acciones gubernamentales para la detección temprana del cáncer de mama en América Latina. Retos a futuro. Salud Publica Mex 2010;52:533-543.
- (11) Plan nacional de prevención y detección precoz del cáncer colo-rectal. Ministerio de Salud Pública Uruguay. 2008
- (12) OMS/IAEA Base de datos del directorio de centros de radioterapias (DIRAC), consultado el 28 de Agosto del 2013, en <http://www.naweb.iaea.org/nahu/dirac/>.
- (13) Universidad de Wisconsin. Centro colaborador de la OMS para las políticas sobre el dolor y los cuidados paliativos, Base de datos sobre consumo de opioides 2010, consultado el 28 de Agosto del 2013, en <http://www.painpolicy.wisc.edu/countryprofiles/amro>.